

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες καλλιέργειες πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΩΝΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκασθη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Collis® 20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
(Μπόσκαλιντ/Κρεσοξίμ-μεθύλ)

Εγγυημένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΝΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Española S.A., Ισπανία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη. © Σήμα κατατεθέν της BASF

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **500 κ.εκ.**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο δραστικών συστατικών, kresoxim-methyl και boscalid, με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του ιδιού. Το kresoxim-methyl παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) και εμφανίζει διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid επίσης εμποδίζει την κυτταρική αναπνοή, αλλά σε διαφορετική θέση δράσης και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το COLLIS παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροφής.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού):

• **Αμπέλι** – Για την καταπολέμηση του ιδιού (*Uncinula necator*). Δόση: 40. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. Συνιστώνται προληπτική ψεκασμοί, από την έναρξη της άνθησης μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών, σε διαστήματα των 10 – 14 ημερών. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. • **Αγγούρι, Κολοκύθη (θερμοκήπιο-αγρός)** – Για την καταπολέμηση του ιδιού (*Erysiphe chacharasearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Δόση: 40-50. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. • **Πεπόνι, Καρπούζι (αγρός)** – Για την καταπολέμηση του ιδιού (*Erysiphe chacharasearum*). Δόση: 40-50. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. **ΠΑΡΗΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ή εξέλιξης της ασθένειας. 2. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Εφαρμόστε το COLLIS, προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και όχι θεραπευτικά. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη από τον παρασκευαστή δόση. Εφαρμόστε το COLLIS σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. -Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, με όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Με άφθονο νερό. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Στο αμπέλι να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl. Στο αγγούρι και κολοκύθη θερμοκήπιου να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν pyridoxifen, pyrimethanil και cyromazine, σε ψεκασμούς φυλλώματος, ενδέχεται να προκληθεί περιφερειακή νέκρωση των νεαρών φύλλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδυασμού στο βυτίο με περισσότερα του ενός φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή προσθήκης προϊόντων θέρψης σε πολλαπλούς συνδυασμούς να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Αμπέλι: 35 ημέρες. Αγγούρι, κολοκύθη, πεπόνι, καρπούζι: 3 ημέρες. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες από -5°C έως 30°C. **ΩΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπερνούν υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αναποστρέφονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).