

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν ο παθώντας είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε 200-300 κ.εκ. νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 77.93.777

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΝΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ.

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα σε μίγματα με μυκητοκτόνα που διαθέτουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης και σε προγράμματα εφαρμογών που επιτρέπουν την εναλλαγή των δραστικών ουσιών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εφαρμογή με στρωματούριες ή άλλες δραστικές ουσίες των μυκητοκτόνων QoI (quinone outside inhibitors) να περιορίζεται στις 2 ανά έτος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στη γεωργική καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό εργασίας εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΑΚΕΥΣΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο με τα ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρούμε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του παραβίαση συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

051402α

pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin 20% β/ο
(Στρωματούριες, ομάδα μεθοξυκαρβαμικά)
Βοηθητικές ουσίες 80.3% β/β

Μυκητοκτόνο με δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν το φύλλωμα των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, τριττάλε) καθώς και του καλαμτοκίου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνση στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδυμασία. • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. • Πλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αερισμένο χώρο. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδυναμία. • Ξεπλύνετε το στόμα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. • Μαζέψτε τη χυμίνη ποσότητα. • «Για να αποφευχθούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦ.: 60415/16-4-2014

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860100, www.basf-agro.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το COMET® 20 EC είναι ένα μυκητοκτόνο με δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν το φύλλωμα των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, τριττάλε) καθώς και του καλαμτοκίου. Επίσης έχει επίδραση στη φυσιολογία των φυτών ακόμη απουσία ορατών συμπτωμάτων ασθενείας. Περιέχει Pyraclostrobin το οποίο παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπληστική και διασπαστική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Μετά την εφαρμογή του, απορροφάται μερικώς από τα φύλλα, το οποίο εξηγεί τη προστατευτική, διασπαστική και τοπικά διασυστηματική του δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της βλάστησης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΙΤΑΡΙ (σκληρό και μαλακό), **ΤΡΙΤΤΑΛΕ** για Καστανή Σκωρίαση (*Puccinia recondita*), **Κίτρινη Σκωρίαση** (*Puccinia striiformis*), **Διδίο** (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*), **Σεπτορίωση** (*Septoria tritici*, *S.nodorum*), **Φουδάρωση** (*Fusarium* sp.), **ΚΡΙΘΑΡΙ** για Σκωρίαση (*Puccinia hordei*), **Δικτυωτή κηλιδίωση** (*Pyrenophora teres*) και **Ρυγχοσπορίωση** (*Rhynchosporium secalis*), **Διδίο** (*Blumeria graminis* f. sp. *hordei*): Συντίθεται η εφαρμογή του από την εμφάνιση του 5^{ου} αδαφίου έως και το τέλος της άνθισης με χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες. **Δόση:** 100-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **ΚΑΛΑΜΤΟΚΙΟ** για Ελμινθόσποριση (*Helminthosporium turcicum*), **Σκωρίαση** (*Puccinia sorghi*): Συντίθεται η εφαρμογή του από το στάδιο της επιμήκυνσης του βλαστού, μέχρι την άνθιση της φόβης και την πλήρη εμφάνιση των σπορίων στο σπάδο (BBCH 65). **Δόση:** 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

Το COMET® 20 EC έχει επίδραση στη φυσιολογία των φυτών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής, ακόμη και σε συνθήκες απουσίας ορατών συμπτωμάτων της ασθενείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Εφαρμόστε το COMET® 20 EC προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθενείας.
- Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθενείας, σε υψηλές βροχοπτώσεις ή σε υψηλό ρυθμό αύξησης της βλάστησης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση διατηρώντας ένα μεσοδιάστημα των τον επόμενο ψεκασμό ίσο με 21 ημέρες.
- Συνιστάται η χρήση των όγκων του ψεκαστικού υγρού κατά τέτοιο τρόπο ώστε επιτυγχάνεται μια πλήρης και ομοιογενής κάλυψη της βλάστησης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν, στις συνηθισμένες δόσεις, έχει δείξει άριστη εκλεκτικότητα σε όλες τις ποικιλίες του σιταριού, του κριθαριού και του αραβοσίτου που εξετάστηκαν. Σε περίπτωση αύξησης με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συνιστάται να γίνονται δοκιμαστικές εφαρμογές σε ορισμένα φυτά πριν να διευρυνθεί η εφαρμογή σε όλη την έκταση της καλλιέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα, πρέπει να διατηρείται το μακροτέρω διάστημα για την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι προφυλάξεις που προβλέπονται για τα προϊόντα πιο τοξικά.

Αν συμβούν περιστατικά δηλητηρίασης, ενημερώστε το γιατρό για την ανάμιξη που πραγματοποιήθηκε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Τριττάλε, Κριθάρι: 35 ημέρες. Καλαμτόκιο: Προσδιορίζεται από το τελικό στάδιο εφαρμογής.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

