

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους. • Χρησιμοποιήστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπανθούν τα νερά της άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μετά το ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορριπναικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρήστε το στην αρχική του απορροσάστη συσκευασία, σε καλά κλειστό, ξηρό και δροσερό χώρο, μακριά από τον ήλιο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



02/2012-1



®

Flumeturon (Φλουομετουρόν) 50%

Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Flumeturon 50% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 54,15% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 7078/07.10.1986

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Magma Γεωργικές Εισροές ΕΠΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Οινόφυτα Βοιωτίας

Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Υδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210688977, 2106889778

ΚΟΤΟΡΑΝ 50%:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα δραστικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους αμέσως μετά την σπορά ή μεταφυτωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην βάση των βαμβakoφύτων, όταν έχουν ύψος 10-15 εκατοστά, με 30-60 λίτρα νερό/στρ. Η εφαρμογή να γίνεται με μηκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το φάρμακο, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΒΑΜΒΑΚΙ: Καταπολέμηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων α) **Αμέσως μετά τη σπορά:** Δόση: **250-500 κ.εκ./στρ.** με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα. β) **Μεταφυτωτικά:** Όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ. με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην βάση των βαμβakoφύτων. Δόση: **200 κ.εκ./στρ.** με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση είναι ανάλογη με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες σε ελαφρά εδάφη. 2) Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του, ν'ακολουθεί βροχή ή άρδευση με 20-30 μ³ νερό/στρ. 3) **Ετήσια ζιζάνια:** **Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:** Αιματοδόχο, Μουκρίτσα, Σετάριας, Ήρες. **Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:** Αγριονοματιά, Βήλη, Χαμομήλι, Λουμπούδις, Μεγαλόκρηνη κολλήτσιδα, Αντράκλια, Μαρτιάκος, Άγριο σινάπι, Αγριομελίτζα, Λάπαθο, Αγριονομαριά, Πολυκόμνη. **Ανεκτικά ζιζάνια:** Αγριοβαμβάκι, Αγριοβίσκος, Μολόχα, Περικοκλάδα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια. Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 κ.εκ. ανά στρέμμα, τότε δεν πρέπει να φυτεύονται μετά την συγκομιδή του βαμβაკιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολλοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα, μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει 1 χρόνος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα.