

ΠΡΟΒΛΑΨΕΙΣ

Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή μην έχετε Φάρμακα, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το εγχειρίδιο την επόμενη «Φάρμακα κατάλληλες μπότες».

«Οι ερwanτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια και να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

Για να αποφύγετε κινδύνους για την αντανάγκη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ενδεδειγμένα με τα ψεκαστικά υγρά ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν οι ερεθισμοί παραμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το εγχειρίδιο την επόμενη «Φάρμακα κατάλληλες μπότες».

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:

(210) 7737777

fine

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: FINE AGROCHEMICALS LTD, Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK



κελλοφαρμ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι

dazide ENHANCE[®] 85 SG DAMINOZIDE (NTAMINOZAINT) 85%

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ. 8195 /31-01-2011

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

Εγγυημένη σύνθεση:

daminozide 85% β/β (ομάδα: υδραζιδία)

Βοηθ. ουσίες: 14 % β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία για χρήση σε χρυσάνθεμο, ηλιάνθο, ασπρη, σταυρανθή, κόκκο, Dicenta, λουπέλια, νεμέζια, ρηlox, σάλβια, κατηφέ, βίολα, ζίνια, καλανχόη, ορτανσία, πετούνια, αζαλέα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**Πολύ τοξικό
για τους
υδροβίους
οργανισμούς.
Μπορεί να
προκαλέσει
μακροχρόνιες
δυσμενείς
επιπτώσεις
στο υδάτινο
περιβάλλον.**

Καθαρό βάρος: 1 κιλό

© Το Dazide Enhance είναι εγκεκρίμενο εμπορικό σήμα της Fine Holdings Ltd.

Το υλικό και οι περιέκτες του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφράξτε σε ειδικές οδούς/οδούς δεδωμένων ασφαλείας ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με ακισίμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογνώσεις ή περιβαλλοντικές στα:** -Να μην εφαρμόζεται το DAZIDE ENHANCE 85 SG εντός διαστήματος 7 ημερών (πριν ή μετά) από την εφαρμογή χαλκούχου σκευασμάτων (πιθανότητα εγκαυμάτων στα φύλλα). - Το φύλλωμα των ψεκασμένων φυτών δεν πρέπει να βραχεί με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. - Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφικές, που έλαψή νερού, ζημιές παγετού ή νηματοφάγες. - Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας σε καλά ποτισμένα αλλά στεγνά φυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Παρτίδας -Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: βλέπε επί της συσκευασίας

DAE/GR/1/11

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρυσάνθεμο:

Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων σε:

α) Φυτά σε γλάστρες:

Εφαρμογή με 2,5 - 5 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 1000 γρ./ στρέμμα) όταν η νέα βλάστηση αποκτήσει μήκος 2 εκατοστών. Η δόση εξαρτάται από την ποικιλία και την ταχύτητα ανάπτυξης. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 200. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται.

β) Φυτά κοπής μονών δρεπών ανθέων (Standard chrysanthemums):

Ακολουθήστε πρόγραμμα 1 - 3 εφαρμογών ανάλογα με την ταχύτητα ανάπτυξης και την ευρωστία της καλλιέργειας με δόση εφαρμογής 2 - 4 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται. Ή εναλλακτικά για ποικιλίες ταχείας ανάπτυξης (π.χ. ευρο) ακολουθήστε πρόγραμμα 2 εφαρμογών με δόση εφαρμογής 5 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 750 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται.

γ) Για τις ποικιλίες Shoesmith & Rivalry sports:

0,6 γρ./ λίτρο και 1,0 γρ./ λίτρο. (μέγιστο 135 γρ./ στρέμμα) κατά την 7η και 14η μέρα αντίστοιχα μετά την έναρξη πρόκλησης παραγωγής ανθέων. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 εφόσον απαιτείται.

Ηλιάνθος (σε γλάστρες ή θερμοκήπιο): Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων.

Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Εφαρμογή με 4 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./ στρέμμα) ο χρόνος και ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτώνται από την ποικιλία και την ταχύτητα αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

Καλλωπιστικά σε γλάστρες (ασθήρ, σταυρανθή, κόσμος, Dicenta, λομπέλια, νεμζία, ρήλοχ, σάλβια, κατηφές, βιόλα και ζίνια περιλαμβανομένων): Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Δόση εφαρμογής 1,5 - 6 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 900 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 7 ημερών εφόσον απαιτείται. Η δόση, ο χρόνος και ο αριθμός εφαρμογών που απαιτείται για ικανοποιητική επίδραση στην ανάπτυξη εξαρτώνται από το είδος και την ποικιλία καθώς και από την ταχύτητα αύξησης και ανάπτυξης του φυτού.

Γι' αυτό και συνιστάται να προηγηθούν δοκιμές μικρής έκτασης πριν την ευρεία χρήση του. Το εύρος της δόσης σχετίζεται με την ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες δόσεις απαιτούνται σε συνθήκες που προκαλούν ταχεία ανάπτυξη και σε ταχέως αναπτυσσόμενες ποικιλίες και οι μικρότερες σε συνθήκες αργής ανάπτυξης (π.χ. χαμηλού φωτισμού) και σε ποικιλίες αργής ανάπτυξης. Για τα καλλωπιστικά σε γλάστρες δόσεις μεταξύ 1,5 και 3,5 γρ./λίτρο είναι επαρκείς για τις περισσότερες περιπτώσεις. Η δόση εφόσον απαιτείται μπορεί να αυξηθεί έως τα 6 γρ./λίτρο ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης.

Καλάνχολη: Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Εφαρμογή με 1-3 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 450 γρ./στρέμμα) όταν τα φυτά αναπτύσσουν νέα βλάστηση (περίπου 2 εκ.). Όλες οι εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν οι ανθοφόροι οφθαλμοί γίνουν σαφώς ορατοί. Οι εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση της άνθησης. Σε ευαίσθητες ποικιλίες και υπό ορισμένες συνθήκες (χαμηλός φωτισμός και/ή χαμηλή θερμοκρασία) μπορεί να παρουσιαστούν ελαφρά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στο φύλλωμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 80 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 7 ημερών. Ο αριθμός των εφαρμογών και το μεσοδιάστημα εξαρτώνται από την εποχή και την ποικιλία.

Ορτανσία: Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Έναρξη εφαρμογών όταν τα φυτά αναπτύσσουν νέα βλάστηση. Η 1η εφαρμογή όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 1-2 εκ και πάντως όχι αργότερα από 4 εβδομάδες μετά την έναρξη του φορτισρίσματος. Δόση εφαρμογής 4 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 9 - 10 ημερών εφόσον απαιτείται.

Πετούνια: Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Δόση εφαρμογής 4 - 6 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 900 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα 4 - 5 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η δόση, ο αριθμός και ο χρόνος των εφαρμογών ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία και το ρυθμό ανάπτυξης.

Αζάλεα σε γλάστρες: Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων και δημιουργία πιο σκουρόχρωμων φύλλων. Ένας ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. Δόση εφαρμογής 2,5 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 250 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 100. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1. Η ανταπόκριση των φυτών στο προϊόν μπορεί να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης και πραγματικές καλλιεργητικές συνθήκες (θερμοκρασία, ένταση φωτός κλπ). Συνιστάται στους παραγωγούς καλλωπιστικών φυτών να δοκιμάζουν το προϊόν υπό τις δικές τους τοπικές συνθήκες και τις ποικιλίες που καλλιεργούν σε μικρές πιλοτικές εφαρμογές πριν προχωρήσουν σε εφαρμογές μεγάλης έκτασης.

2. Η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε θερμοκήπια

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αμείωσας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις προτεινόμενες καλλιέργειες εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Ωστόσο η αντίδραση των φυτών εξαρτάται από την ποικιλία, το στάδιο και το ρυθμό ανάπτυξης και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση της άνθησης ή παραγωγή ανθέων με πιο ωχρό χρωματισμό. Να μην εφαρμόζεται στην ποικιλία χρυσάνθεμου Fandango.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμοσимо (προορίζεται μόνο για καλλωπιστικά φυτά).

Τρόπος δράσης: Φυτορρυθμιστική ουσία για μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας –μειώνοντας τα επίπεδα των γιβερελλινών στο φυτό με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης των φυτών”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.”

Παρασκευαστής:

FINE AGROCHEMICALS LTD,
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK

Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας: Schirm Sideco, Γερμανία