

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές•Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε • Μην αναπνέετε τα εκνεφεύματα •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και ψεκασμό •Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδυναμία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (βλέπε την ετικέτα αν είναι δυνατό) •Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο:Απομακρύνετε τον παθόντα από τη μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ή ψεκασμένα ρούχα. Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό, μην παραλείψετε να αφαιρέσετε τυχόν φακούς επαφής. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπουνί χωρίς να το τριβείτε. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Διατηρήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματός του. Ελέγξτε την αναπνοή του. Αν το κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Εκτιμήστε την ανάγκη πραγματοποίησης γαστροεντερικής πλύσης. Ελεγχος των ηλεκτρολυτών. Μπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Μεταφέρετε τον ασθενή σε κάποιο νοσοκομείο και αν είναι δυνατό, πάρτε μαζί σας την ετικέτα ή τη συσκευασία.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΗΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σκαυέλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγούμενες με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: **Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαράβατη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής - Ημ.Λήξης: Βλέπε επί της συσκευασίας

DANTOP® 50WG

Clothianidin (Κλοθιανιντίν) 50% Εναιωρηματοποίηση κόνι (WG)
Εγγ. Συνθεση: Clothianidin 50% B/B. Αρ. Εγκρ. Κυκλοφ: 14359/2-06-2010,
Βοηθητικές ουσίες 47,9 % B/B. Ημ. Λήξης: 31-7-2016

Εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικωτινοειδών. Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρά δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικωτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

X

Χ

Επιβάλλεται σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει ενοχλοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

N

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 140 γρ.

κ

ε

κ

ε

κ

ε

Υπευθύνος επικοινωνίας - Εργαστάσιο συσκευασίας:

ΑΘΗΝΑ: Μέγαρχ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 68 00 900-9
06Σ/ΝΗΚ: Τηλ. θυρίδα 1203, 01 ΠΕ 9, 97022 Σύνθετ. ΠΑ. 2310 797 907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλida Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380 22 008-9
e-mail: info@kellafarm.gr

ΠΕΔΙΟ ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιά, Αχλαδιά: για Πρόσληψη αφίδα με δόση 15 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15 γρ./ στρέμμα. Ψεκασμός κάλυψης από το τέλος της άνθησης μέχρι στον α καρπός αποκτήσει περίπου το 70% του τελικού του μεγέθους. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100. **Ροδακινιά, Νεκταρινιά:** για Αφίδες με δόση 8-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 14 γρ./ στρέμμα μέγιστο. Ψεκασμός κάλυψης προληπτικά κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής ή μετά την άνθηση με την εμφάνιση της προσβολής. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150. **Πατάτα:** για Δορυφόρο και αφίδες με δόση 4-6 γρ./ στρέμμα. Ψεκασμός κάλυψης μετά την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας με την εμφάνιση της προσβολής. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 15 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100.

Παρατηρήσεις: Στη ροδακινιά να μην ξεπερνιούνται κατά την εφαρμογή τα 14 γρ. σκευάσματος ανά στρέμμα.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: -Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο. - Να αποφευχθεί η χρήση του DANTOP σε καλλιέργειες που έχουν ψεκαστεί με άλλα νεονικωτινοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. - Να γίνεται εναλλαγή του DANTOP με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικωτινοειδή.

Δε συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε φυτά που προσβάλλονται για πολλαπλασιαστικό υλικό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όποιοι εργάτες εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό μέχρι και 48 ώρες μετά τον ψεκασμό, να χρησιμοποιεί προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κάλυψης. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Μετά την εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύνετε το καλά με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αδειάστε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδατινούς πόρους.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συστάσιμες οδηγίες και χρήσεις.

Προστασία των καταναλωτών (Τελεutaία επέμβαση πριν τη συγκομιδή): **Μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά: 14 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες**

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διακίνηση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μη μαλινέτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επηρεασικά νερά.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων μέχρι τη γεωργική γη.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνων.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζώων.

Απομακρύνετε ή/ και καταστρέψετε τα ζώα πριν την ανθοφορία τους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.