

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνεύστε αέρα. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με φρέσκο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία (ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκαλέσει εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. • Οι εγχύσεις θα πρέπει να φέρουν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρούνται κατά τη διάθεσή τους επικινδύνια απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, ανακυκλώστε σε ειδικές οδηγίες (δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΩΛΟΤΟ: Γενικά Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε ορθόλημμα. Σε περίπτωση εισπνοής αποφύγετε τον πεδίο στον καθαρό αέρα και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκαλέσει εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη για όλες τις καλλιέργειες. Επικινδύνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα-επικινιστές να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε η/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με νερό ως τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 49 ημέρες. Τριανταφυλλιάς χαμηλού υψους: μη εφαρμοσίμο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη

Δέλεαρ

DELEAR 10 EC

Εντομοκτόνο

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)
Cypermethrin - Σάϊπερμέθριν 10%

Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin : 10 % β/ο
Βοηθ. ουσίες : 88,1 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή παραμόρφωση μνησμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

- Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ευφλεκτό.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 14.367 / 20.06.2011

Κάτοχος της έγκρισης :
CHIMAC S.A.: Rue de Renay, 26/2 B-4102 Ougree, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση – Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
 YPSILON®
Δ. Γένιο 32, Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ. 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών /καλλιεργητ. περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα	κ.εκ. / 100λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού/ λίτρα/ στρέμμα		
Ελαιокράμβη	Σκαθάρι της γύρης (Meligethes aeneus)	25	-	30	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τριανταφυλλιάς χαμηλού υψους	Αφίδα της τριανταφυλλιάς (Macrosiphum rosae)	-	25	100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα αρθρία αρθρόποδα. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με **DELEAR 10EC**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση : Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.