

Ντεβρινόλ 45%: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστών και ημιανθούριων ζιζανίων. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροτηλώς. Αναστέλλει την ανάπτυξη και αύξηση των ριζών.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για την καταπολέμηση ετήσιων ημιανθούριων και αγρωστών ζιζανίων.

ΦΡΑΥΛΙΑ: Δόση: 700-1000 κ.εκ./στρ. Εφαρμόζεται σε μεταφύτευμενη και σε ήδη εγκατεστημένη φράουλα: α) Την άνοιξη ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Αν δε βρέξει μέσα σε 1 εβδομάδα, πρέπει να γίνει ενσωμάτωση με τεχνική βροχή ή να ενσωματωθεί σε βάθος 2-2,5 εκ. β) Τέλη ανοίξεως και το καλοκαίρι, ψεκάζουμε στην επιφάνεια του εδάφους. Αν δε βρέξει μέσα σε 24 ώρες, πρέπει να ενσωματωθεί με τεχνική βροχή. **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΚΑΠΝΟΣ:** Δόση: 250-500 κ.εκ./στρ. α) Προφυλακτικά: Ενσωμάτωση σε βάθος 2,5-5 εκ. μέσα σε 2 μέρες από την εφαρμογή. β) Προφυλακτικά: Επιφανειακός ψεκασμός αμέσως μετά τη σπορά ακολουθούμενος με τεχνική βροχή 1-2,5 εκ., αν δεν πέσει βροχή μέσα σε 2 ημέρες. **ΣΠΟΡΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ-ΠΙΠΕΡΙΕΣ-ΚΑΠΝΟΥ:** Δόση: 250-500 κ.εκ./στρ. ή 25-50 κ.εκ./100 τ.μ. Ο ψεκασμός γίνεται στην επιφάνεια του σπορείου, μετά τη σπορά και πάντοτε πάνω στο στρώμα κοπριάς ή άμμου που προστίθεται πάνω από το σπόρο. Όγκος ψεκαοτικού διαλύματος: 200-250 λίτρα/100 τ.μ. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλάδι)-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκιν-Βερυκοκί)-ΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Λεμονιά-Μανταρινιά-Γρέιφ φρουτί)-ΑΜΠΕΛΙ:** Δόση: 900-1000 κ.εκ./στρ. Εννήκία ή φυτώρια: α) Προφυλακτικά: Ενσωμάτωση σε βάθος 5 εκ. μέσα σε 5 ημέρες από την εφαρμογή του (οι γυνέες ρίζες να μην έρχονται σε επαφή με το ψεκαομένο χώμα). β) Επιφανειακή εφαρμογή μετά το φύτεμα ή σε εγκατεστημένα φυτά. Συνιστάται ψεκασμός σε γυνέες εδαφικές επιφανείες (αν υπάρχουν πολλή αγριόχορτα, χρησιμοποιείται μείγμα με ένα ζιζανιοκτόνο επαφής). Πρέπει να χρησιμοποιείται αρκετό νερό για να περνά το υπάρχοντα ζιζάνιο και να φθάσει στην εδαφική επιφάνεια. Εφαρμόζεται τεχνική βροχή 1-2,5 εκ. ή πότισμα, αν δεν πέσει βροχή μέσα σε 7 ημέρες από τον ψεκασμό.

Παρατηρήσεις:
1) Μην ψεκάζετε πάνω από 1 φορά το χρόνο.
2) Καταπολέμηση ζιζανίων: α) Ετήσια αγρωστών: Μουκρίτσας, Αγριοβάρδι, Πάα ετήσια, Αιματόχορτο, Στεφάνιος, Βέλιουρας από σπόρο, Ήρα κοινή, Αγριοκρίθαρα, Αλεπουράκι, β) Ετήσια ημιανθούρια: Λουβουλιά, Αντράκλα, Βίλητα, Ζωχός, Ξυθήρα, Στελλάρια, Μαρτιάκος, Μοδόκος, Αγριομαργαρίτες, Κολλήταϊδα, Πολυκόμμι.
3) Οι μικρές δόσεις συνιστώνται για ελαφρά εδάφη και οι μεγάλες για βαρεια εδάφη.

Devrinol®

45SC

Napropamide (Ναπροπαμίδη) 45%
Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Napropamide** 45% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 54,21% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φαρ.: 7457/9.3.94/00

**Ζιζανιοκτόνο
για καταπολέμηση ετήσιων
αγρωστών και ημιανθούριων
ζιζανίων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απογορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Παρασκευαστής:
United Phosphorus Ltd. - Άγγλη

Αντιπροσωπός-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΠΕΤΡΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα
Τηλ.: 2310784931-6, φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 50 κ.εκ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθιστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πиеίτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. •Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβήκημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. •Να διατηρείται μόνο στην αρχική του συσκευασία, η οποία να παραμένει πάντα ερμητικά κλεισμένη. •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Μεταφέρεται αμέσως τον ασθενή στο νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα του φαρμάκου. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική αγωγή. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

02/Κ/2008-01

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΕΣ: Διατηρείται στο αρχικό κλειστό δοχείο, σε χώρο ήλιου και άρρεσης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. Παρατηρείται ίζημα σε αμελητέα ποσότητα και διαχωρισμός φάσεων: σάβανο σβώδος <2% που ανακατατάσσεται όταν ανακινείται το δοχείο.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδαφος με 40-50 λίτρα ψεκαοτικού διαλύματος ανά στρέμμα. Πίεση ψεκαοτικού μέχρι 3 atm (45 psi) και πιεζ. τύπου σκούπας. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φαρμάκου. Μετά την εφαρμογή, πρέπει να γίνει ενσωμάτωση με τεχνική βροχή, αν δε βρέξει μέσα σε 1-7 ημέρες ανάλογα με την εποχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείται καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου σε λίγο νερό, σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαοτικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτουμε την προδιόριση του φαρμάκου με συνεχή ανάδευση, προσθέτοντας το υπόλοιπο νερό. Το κενό συσκευασίας ξεπλένεται πολλές φορές και το νερό ρηθιμότητας ρίχνονται στο ψεκαοτικό δοχείο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φράουλα: προ της άνθησης. Μηλιά-Αχλάδι-Ροδάκιν-Βερυκοκί-Εσπεριδοειδή-Αμύλη: 35 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

•Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπέρματα. •Χρησιμοποιείται χωριστά ψεκαοτικό μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην σπέρνετε στο ίδιο χωράρι μολύβι, σπέρμα, σόργο, καλαμπόκι, μαρούλια και ζωορότευτρα, πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή. •Απορριπτεται τη χρήση του σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10% όπως επίσης σε πολύ ήπια και αμυδρά εδάφη. •Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. •Πάρτε συστημένες προφυλάξεις να μη μολυνθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Αν ρυπαίνονται τα νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιούνται για άμεση άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Μη διαφωκεάζετε το άκρο των ζωνών. •Μην αδειάζετε τις δόσεις. •Χρησιμοποιείται πιεζ. τύπου σκούπας. Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). •Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστώνται. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαοτικά με νερό και απορριπτεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Στις συνιστώμενες δόσεις και χρήσεις δεν είναι φυτοτοξικό. Να μη χρησιμοποιείται στη φράουλα από την άνθηση μέχρι τη συγκομιδή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Devrinol 45SC μπορεί να συνδυαστεί με Tillam 6E για καταπολέμηση περισσότερο ανθεκτικών ζιζανίων σε μεταφύτευμενη τομάτα και καμψό στις δόσεις 400 κ.εκ. Devrinol 45SC + 500 κ.εκ. Tillam 6E.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Το κενό δοχείο συσκευασίας ξεπλένεται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαοτικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα ενσωματωθούν όλα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



**ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**