



NitroFarm SA

DI-LIGER 48EC

chlorpyrifos 48 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που δρα μέσω της αναπνευστικής οδού, αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χοληνεστεράσης (acetyl-cholinesterase).

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής
- Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση
- Δολώματα

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

**Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του παραγωγού, καθότι μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις τρόπους:
 - ψεκασμούς φυλλώματος: οπότε καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα φυλλώματος
 - ψεκασμούς εδάφους: οπότε καταπολεμά έντομα εδάφους
 - Δολώματα: για όψιμες προσβολές κοφτοσκούληκον και πρασάγγουρα, όταν πλέον δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν κοκκώδη εντομοκτόνα εδάφους
- **ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ (PHORATE, TERBUFOS, CARBOFURAN, CARBOSULFAN, FENBURACARB)**

- Είναι χαμηλής τοξικότητας (3^η κατηγορία τοξικότητας), οπότε Δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.
- Ευρύ φάσμα δράσης (χρήση και σε δενδρώδεις και σε εκτατικές καλλιέργειες (βλ. Ετικέτα).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 250κ.εκ. ➤ 1 λίτρου
- 500κ.εκ. ➤ 5 λίτρων