



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: DIFCOR 250 EC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 25 % β/ο δραστική ουσία (difenoconazole) και 75.69 % β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Κάτοχος της Έγκρισης: GLOBACHEM n.v.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ANORΓΚΑΧΗΜ ΑΕ

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

Μηλιά: Φουζικλάδιο (*Venturia sp.*) με 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/στρ. (max. 30 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής (συνήθως το μήνα Μάρτιο) που συνεχίζονται ανά 10 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (φυσικό αραίωμα) (συνήθως τέλος Μαΐου) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.

Ζαχαρότευτλα: Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*) με 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/στρ. (max. 50 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (Μάιο-Ιούνιο) και επανάληψη κάθε 14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά: Μέχρι 4 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 10 μέρες μεταξύ των εφαρμογών.

Ζαχαρότευτλα: Μέχρι 3 εφαρμογές/καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 14 μέρες μεταξύ των εφαρμογών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Είναι σημαντικό να ακολουθούνται πιστά οι συνιστώμενες δόσεις/στρέμμα. Δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ψεκασμοί με το DIFCOR 250 EC στην ίδια καλλιέργεια κατά την ίδια καλλιεργητική περίοδο εφόσον υπάρχει υψηλή πίεση της ασθένειας. Εφόσον είναι απαραίτητο να γίνουν επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Εάν διαπιστωθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος DIFCOR 250 EC τότε θα

πρέπει να γίνει εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Για την αποτελεσματική διαχείριση της ανθεκτικότητας συνιστάται η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών καθώς και η αμειψισπορά.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):

Μήλα: 14. Ζαχαρότευτλα: 21.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.