

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα με κατάπτωση, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιές, Πορτοκαλιές, Μανταρινίες, Γκρει-φρουτ, Κιτριά): για Ανθοτήρη στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200-400 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας φεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετάποτε 7-10 ημέρες.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλί, Φιοτικό, Φουντούκι): για Φύλλοδετες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονυμευτές στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενέας, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερμονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Αριθμός εφαρμογών: Εφαρμογή με την εμφάνιση κάθε νέας γενιάς.

ΜΗΑΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλάδι): για Φύλλοδετες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονυμευτές στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενέας, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερμονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Αριθμός εφαρμογών: Εφαρμογή με την εμφάνιση κάθε νέας γενιάς.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκά, Ροδακινί, Κερασί, Δαμασκηνιά): για Ανάρια, Φύλλοδετες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονυμευτές στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενέας, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερμονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Αριθμός εφαρμογών: Εφαρμογή με την εμφάνιση κάθε νέας γενιάς.

ΑΜΠΕΛΗ: για Ευδεμίδια, Κογχλιάδι, Ροδάκινη, Κερασί, Δαμασκηνιά: για Ανάρια, Φύλλοδετες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονυμευτές στη δόση 30-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-150 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Φεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής όπου συνιστάται ένας φεκασμός μια εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενεάς στον εντόμο. 4 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση αποικιας γεωργικών προειδοποιήσεων συνίσταται η εφαρμογή φεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) Λίγο πριν την άνθηση. β) Κατά την γονιμοποίηση των ανθέων. γ) Όταν οι ράγες έχουν μεγεθύνει μπιζέλιου και δ) Με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Αριθμός εφαρμογών: 4.

ΕΛΙΑ: για Ηπαντροτήρη (ανθούρια γενιά) στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-300 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Φεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι φεκασμοί: Οταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοιξεί. Φεκαδόμωμάς εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάνα, Πράσο): για Πράσινο οκουλήκι, Προνύμφες φυλλώματος, Πιπερίδια στη δόση 40-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα): Τομάτα 50-150, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μπάνα 50-100, Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα 100, Μαρούλι 60-80, Πράσο 50-80. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή συμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 2.

BAMBAKI: για Πράσινο οκουλήκι, Ρόδινο οκουλήκι στη δόση 30-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-80 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή συμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: για Πυραΐδα, Πράσινο οκουλήκι, Σεζάμια στη δόση 40-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-100 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή συμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 2.

ΚΑΠΝΟΣ: για Πράσινο οκουλήκι στη δόση 30-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-150 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή συμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εφόσον εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή.

ΚΑΛΑΜΠΙΖΙΚΑ: για Φυλλοφάγες και Ανθοφάγες προνύμφες στη δόση 30-50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200-300 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή συμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 2 ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει προσβολή.

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Πεύκο, Βελανδόμι): για Φυλλοφάγες προνύμφες στη δόση 25γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 300-500 λίτρα φεκαστικού υγρό/στρέμμα. Για Πιτουσάκι φεκασμός φυλλώματος το Σεπτέμβριο. Για Λιμανάρια φεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο/ Μάιο. Για Υφάντρια. Μαλακόσωμα φεκασμός φυλλώματος τον Μάιο/ Ιούνιο. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΠΟΗΘΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: για Εφέσια στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών της αποήθεμας. Αριθμός εφαρμογών: 1.

DiPel® 32.000 WP

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

Εγγυημένην σύνθεση:
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351: 6,4% β/β ή
32.000 IU/mg

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προορίζεται μόνο για επαγγελματιές χρήστες

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλ.: 1673/24-07-1996

Καθαρό βάρος: 500 γρ.

Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλία

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

Ε ΚΑΙ. Ευθύμιαδη οβίες

Β.Π.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•ΤΗΛ.2310 568656 •FAX:2310 798423 • e-mail: info@eftymiadis.gr

Σχετικά μη τοξικά για τις μέλισσες

Προτερηγότησης:

- (1) Ψεκασμός μόλις εμφανιστούν οι νεαρές προνυμφές και παρατηρήθουν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώτε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό θύμα όλης της φυλλικής επιφάνειας επειδή οι προνυμφές πρέπει να καταπούν το σκευασμό. Μετά την κατάπτωση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
- (2) Μη φεκάζετε αν αναμένεται βροχή. Αν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά το φεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
- (3) Εγγείωσης θέτετε έναντι της εντόμου αναπτύσσεται ο φεκασμός στην παραγάγοντα συνεχώς για την καταπόλεμη τους. Για να αποφεύγετε ανάπτυξη τέτοιου ειδίους ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής). Ειδικά για την ευδεμίδια και κογκιλιδιά στο αμπελό ο φεκασμός γίνεται στην ζώνη των τασμάτων.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: Διαλύτε την παπούαμην ποσότητα οκεανόματος σε λίγο νερό. Προσθέτετε το πυκνό διάλυμα μόνο με νερό φεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με νερό υπό συνεχή ανδρεστον. Ψεκάζετε το φεκαστικό διάλυμα μέσα σε λίγες ώρες. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο οκεανόματα διαλύτετε πρώτα το DiPEL και μετά προσθέτετε το άλλο οκεανόματα.

Συνθαστικότητα: Δε συνδυάζεται με οκεανόματα που έχουν οξινή ή αλκαλική αντίδραση όπως ο δευτυλωρούχος χαλκός ή διαφυλλικά λιπαρά μάστα.

Καθαρισμός φεκαστρία: ξέπιναμα με αφρόνων νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα βάζα ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έστημα (τα νερά του έστηματος τα ρίχνουν σε φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφύονται καταπάλια της πρεπτέρας χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία σπλαγχνής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσθισης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το οκεανόματα: Μην εισέρχεστε σε φεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσετε τα τελείως το φεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

- Μακριά από τρόφιμα ποτά και ρυζωτρόφες. • Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το φεκαστικό υγρό. • Μη φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Μετά το φεκασμό ασφαλέστε ολια τα ρούχα. Πλύνετε τα πριν έφαγετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με αφρόνων νερό. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακαλυπτά μέρη του σώματος πριν φάτε πιετεί παραπάντα το φεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάπτωσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δειξετε αυτό το δοχείο ή την επικέτα.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπληματική θεραπεία.

ΤΗΛ. KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣ: 210 77 93 777

Σχετικά μη τοξικά για τις μέλισσες
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος: Αποθήκευται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο έργου, ακοτενικό και σε θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βρέπε δοχείο

