

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) .

«Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες»

«Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό»

«Σε περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια».

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: προκαλέστε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μην προκαλέσετε εμετό στον παθόντα αν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριψήμια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

HM, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜ, ΑΛΕΞΗΣ - ΑΡ, ΠΑΡΤΙΔΟΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

DITEX

20 SL

diquat (ντικουάτ) 20 % β/ο (χημ.ομάδα διπυριδιλία)

Εγγυημένη σύνθεση: diquat 20% β/ο (υπό μορφή diquat dibromide 37.4% β/ο) . Βοηθητικές ουσίες 66.4% β/β

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΑΑΔΑ: 70050/12.7.2013

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη δισυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τ

**ΤΟΞΙΚΟ Ν**

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάτοχος της άδειας Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Παρασκευαστής: Syngenta Ltd, H.B.

**χελλαφαρμ Α.Ε.**

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρσούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τοχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδο Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, γκρέιπ-φρούτ, λιμέττια, φράπα), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, βερικοκιά, κεράσια, βυσσινιά, δαμασκηνιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), **Ακρόδρυα** (Άμυγδαλιά, φουντουκιά, φιστικιά, καστανιά, καρυδιά), **Ελιές (ελαιοποιήσιμες), Αμπέλι.** Σε όλες τις παραπάνω καλλιέργειες καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 330-500 κ.εκ./ στρέμμα. Για την εφαρμογή διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 λίτρα καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ψεκάστε τα ζιζάνια προσέχοντας να μη βρέχεται το φύλλωμα των δέντρων.

Τριφύλλι & μηδική. Καταπολεμά την *Cuscuta* sp. με δόση 200-250 κ.εκ./ στρέμμα. Ψεκασμός των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Αν η προσβολή είναι εκτεταμένη, ψεκασμός μετά την κοπή **Πατάτα.** Για αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή με δόση 400 κ.εκ./ στρέμμα. Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν τον ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.

Μηδική για σποροπαραγωγή. Για αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή με δόση 300-350 κ.εκ./ στρέμμα. Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/ στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων
2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμπελιού
3. Η χρήση για αποξήρανση πριν τη συγκομιδή στη μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μη χρησιμοποιούνται για ζωτροφή

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα ανά στρέμμα.

Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού που απαιτείται είναι το λιγότερο 20 λίτρα ανά στρέμμα. Μπκε τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού ως 1 ατμόσφαιρα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη και προσθέτετε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 10 ημέρες για την είσοδο των ζώων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

30 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες εκτός της πατάτας όπου είναι 10 ημέρες, ενώ για τριφύλλι και μηδική δεν ορίζεται.