

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανμείξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. • Δεν θα πρέπει να εισέρχονται στους αερούς, που έχουν ψεκάσει, πριν στεγνώσει το ψεκατικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέληθε στον αερό αμέσως μετά την εφαρμογή, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος, σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. **Κατάποση:** Μην προκαλέσετε έμετο. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χορηγηθούν 2-3 λίτρα νερό και να προκληθεί έμετος μόνον εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό. Αν ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Αναπνοή:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Αντιδότο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντιδότο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφευχθεί η χορήγηση βαρbitουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαρbitουρικού οξέος. Περιέχει abamectin και cyclohexanol. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 21 0793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΕΠΙΚΙΝΑΝΣΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΖΑΝΙΩΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ Ο ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ. *ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΑ ΕΚΗΜΕΡΩΣΟΥΝ, ΟΤΕ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΡΜΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: α) 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, β) 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τριτοτάξου υπαυθίου, γ) 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμικών για εξοδότηση βελβών/μυελών στα θερμικά.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Το σκεύασμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάμεις καλλιέργειες θερμικών κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-φεβρουάριο).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



07/2013:5



Abamectin (Αμπαμεκτίν) 1,8% Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Abamectin 1,8% β/ο** (18 gr/lb)

Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β (περιέχει Cyclohexanol)

A.A.D.A.: 14434/15.05.2013

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο στομάχου & επαφής

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Ή ΚΑΤΑΠΟΣΗ**

syngenta

Παρασκευαστής:
Syngenta Crop Protection AG. - Ελβετία

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2112055555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΝΤΟΜΠΛΕ: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκατικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και, όπου συνιστάται, διαλυτή. Ανακατεύοντας. Συμμηλύνετε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.ε.κ.στ./100 λίτρα ψεκ. υγρού): ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΚΑΛΑΜΠΙΤΙΚΑ ΘΕΡΙΟΚΗΠΙΟΥ (αυτο-βοήθιο & βοηθός ανθεκτικό φυτά-δενδρά-θάμνοι & φυτάρια δασικών δένδρων): Τετράνυχος, Λιμνιόμυξα, Θρίπας, Εριφίρης spp., Ψύλλοι. Δόση: **75-100** (100 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ:** Ψύλλοι, Cacopsylla pyri, Eriphium pyri, Φυλλοκόκκοι, Θρίπας, Τετράνυχος, Πανώνυχος, Aculus schlechtendali, Aculus spp., Erythraeus spp. Δόση: **75** (112,5 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλυση των οβών, σε μέγιστο με παραρικό ήδω 0,25-0,3% ή ήδω προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (πριν την ανθοφορία (<BBCH01 ή μετά την ανθοφορία (>BBCH70)). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΟΚΙΑ:** Ψύλλοι, Cacopsylla pyri, Eriphium pyri, Φυλλοκόκκοι, Θρίπας, Τετράνυχος, Aculus schlechtendali, Aculus spp., Erythraeus spp. Δόση: **75-100** (100 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλυση των οβών, σε μέγιστο με παραρικό ήδω 0,25-0,3% ή ήδω προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 69-89). **ΕΣΤΕΡΙΑΔΕΙΑ (Πορτοκαλά-Λεμονό-Μανταρινό):** Φυλλοκόκκοι, Δόση: **40** (60 κ.ε.κ./στρ.). Πανώνυχος, Τετράνυχος. Δόση: **75** (112,5 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία) σε μέγιστο με παραρικό ήδω 0,25-0,3% ή ήδω μη ιοντικό προσκολλητικό (BBCH 09-89). **ΑΜΠΕΛΙ:** Άκαρη της αμπελώ, Τετράνυχος. Δόση: **50-75** (75 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. BBCH 15-79 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (Α+Θ):** Τετράνυχος, Λιμνιόμυξα, Θρίπας. Δόση: **80-100** (120 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. BBCH 12-89 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). **ΑΓΓΟΥΡΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ (Θ):** Τετράνυχος, Λιμνιόμυξα, Θρίπας. Δόση: **80-100** (120 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 10-89). **ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΣΙ (ΑΙ):** Τετράνυχος. Δόση: **80-100** (120 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 10-89) (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). **ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΣΙ (Θ):** Τετράνυχος, Λιμνιόμυξα, Θρίπας. Δόση: **80-100** (120 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 10-89). **ΜΑΡΟΥΛΙ-ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ-ΑΝΙΘΟΣ-ΣΕΛΙΝΟ (Θ):** Θρίπας. Δόση: **75-100** (50 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). **ΡΑΔΙΟΙ (Θ):** Θρίπας. Δόση: **75-100** (100 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). **ΣΚΑΡΟΛΑ (Θ):** Θρίπας. Δόση: **50-100** (100 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 12-55). **ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ:** Τετράνυχος, Πανώνυχος, Aculus schlechtendali, Aculus spp., Erythraeus spp. Δόση: **75-100** (100 κ.ε.κ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλυση των οβών, σε μέγιστο με παραρικό ήδω 0,25-0,3% ή ήδω προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 69-75).

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Μέλος του



Υγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Καλλινοκτικό (Θ)-Ροδάκινο-Νεκταρινό-Βεριοκό-Δαμασκινό (100), Μηλό-Αχλάδι-Κυδωνό-Εσπεριδοειδών (100), Αμπελί-Ραδί (ΑΙ) (50-100), Πιπερό-Πενό-Καρπούς-Τομάτο-Μελιτζάνα (Α+Θ)-Αγγούρι-Κοκκινό (Θ) (50-120), Μαρούλι-Μαϊντανός-Ανιθός-Σέλινο (ΑΙ) (50).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Καλλινοκτικό (Θ)-Τομάτα (Α+Θ)-Μελιτζάνα-Πιπερό-Αγγούρι-Κοκκινό (ΑΙ)-Μαρούλι-Μαϊντανός-Ανιθός-Σέλινο-Ραδί (ΑΙ): μέχρι 4 / 7 ημέρες. Μηλό-Αχλάδι-Κυδωνό: μέχρι 2 / 7 ημέρες. Ροδάκινο-Νεκταρινό-Βεριοκό: μέχρι 2 / 14 ημέρες. Εσπεριδοειδών: μέχρι 3 / 10 ημέρες. Αμπελί: μέχρι 2 / 14-21 ημέρες. Μελιτζάνα-Πιπερό (ΑΙ)-Σκαρόλα (ΑΙ)-Πενό-Καρπούς (Α+Θ): μέχρι 3 / 7 ημέρες. Δαμασκινία: 1 εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλό, Αχλάδι, Κυδωνό, Αμπελί, Δαμασκινό: **28** ημέρες. Εσπεριδοειδών: **10** ημέρες. Ροδάκινο, Νεκταρινό, Βεριοκό, Μαρούλι, Ραδί, Μαϊντανός, Ανιθός, Σέλινο: **14** ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κοκκινό, Πιπερό, Πενό, Καρπούς: **3** ημέρες. Σκαρόλα: **7** ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αλληθία να αποφευχθεί ο συνδυασμός "Doble + Ród" 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΤΕΛΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΛΙΑΣ:

Το κενό δοχείο συσκευασίας ξεπλύνετε υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκατικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προπριωμένα με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθέτουν όλη σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΧΕΙΜΝΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από φωτιά ή ήδω πηγές θερμότητας σε Ήρρ και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια υπολογιστόν από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.