

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους αποβλήτα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήσεις δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης τοποθετήστε τον ασθενή σε καλή αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Χορηγίστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγίστε τίποτα στον ασθενή και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ανψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στάχους να αφήσετε μίαν ανψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το καλαμπόκι και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως.

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων:

Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητάς του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό καθαρισμού σε ακαθιέρωτο έδαφος μακριά από πηγές νερού.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γεγονικές καλλιέργειες και υδατίνες επιφάνειες):

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από: • 5 μέτρα από υδατίνες επιφάνειες • 10 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για καλλιέργεια του καλαμπόκι • 5 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για τις λοιπές καλλιέργειες. Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκοπή του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριηφά ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριήχημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του DUAL GOLD 96 EC πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες με τις προτεινόμενες δοσολογίες.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

L136034 GREC/8L



S-metolachlor (S-μετολαχλώρ)

Γαβακτωματοποίηση υγρό

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
S-metolachlor 96% β/ο
βοηθητικές ουσίες 9,9 β/β

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών ηλιόφυλλων ζιζανίων στα ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο, βαμβάκι, τομάτα, πατάτα, καπνό.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.,
Λ. Ανθούσας - Ανθούσα Αττικής,
Τηλ.: 210 6666612-13, Fax: 210 6665777
ΒΕΛ/ΚΗ: Β.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΖΕΥΓΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection,
Switzerland

Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 λίτρο e

Αρ. οριστ. Εγκρ. κυκλ. Υπ. Γεωργίας:
7708/15-7-08
Ημ. λήξης Εγκρ. κυκλ.: 31-3-2015

XI

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
NΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο αώτονο περιβάλλον.

Φάσμα δράσης: Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Βαμβάκι, Τομάτα, Πατάτα, Καπνό: Ετήσια αγρωστώδη και μερικά ηλιόφυλλα ζιζάνια*.

Όγκος υγρού (λίτρα/στρ.): 30-60.

Δόσεις σκευάσματος (κ.εκ.σκευάσμ./στρ.) και Τρόπος εφαρμογής:

Αραβόσιτος: 100-160 προφυτρωτικά (αύτομα μετά τη σπορά) 80-100 νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας). **Ζαχαρότευτλα:** 80-130 προφυτρωτικά (αύτομα μετά τη σπορά) **Βαμβάκι:** 100-130 προφυτρωτικά (αύτομα μετά τη σπορά) 100 προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.)**. **Τομάτα:** 100-130 πριν τη μεταφύτευση της τομάτας. **Πατάτα:** 100-130 προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια. **Καπνός:** 100-130 πριν τη μεταφύτευση του καπνού.

Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίδα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria spp.), Σέταρα (Setaria spp.), Βήλητα (Amaranthus spp.), Αγριοκατά (Solanum nigricum), Πισοτρίδα (Portulaca oleracea), Ήρα (Lolium spp.), Καφέλα (Capsella bursa pastoris), Χαμουλή (Matricaria spp.), Καπνόχορτο (Fumaria spp.), Μέτριο ευαίσθητο: Αγριοπιπερί (Polygonum persicaria), Κίτρινη κίληση (Cyperus esculentus), Στελλήρια (Stellaria media), Λουβουδιά (Chenopodium album).

Παρατηρήσεις: 1. * Η μεγάλη δόση είναι για τα βαρέα εδάφη. 2. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: μία (1). 3. Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. 4. ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το DUAL GOLD 96 EC συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG. 5. Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφύτευμένες. 6. Στην αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή. 7. Η εφαρμογή του DUAL GOLD 96 EC δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλήματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την εκκίνηση της δραστηριότητας ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμόδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχοπτώση) αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ορίων ωρών.

Συνδυαστικότητα: Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) του DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεότιπλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυτάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Τρόπος εφαρμογής: Καθοδικός, ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρ. ανά στρ.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -----

Αριθμ. πατάδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη

