

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήττο δεδομένων ασφαλείας.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: Απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.**

**Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αναστατική ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Τρόπος δράσης:** Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διεσπασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (phenyl acetamides) που κινείται διεσπασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολέμα το ωίδιο στο οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο αμπέλι.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Dynali 60/30 DC και ανακινείτε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχανήμα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμίζονται / ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

L167305 GREC/9Q



**Dynali®**  
60/30 DC

**syngenta®**

Difenoconazole (ομάδα τριαζολών DMIs) +  
Cyflufenamid (ομάδα phenyl acetamides)

**Εναιωρηματοποιημένο συμπύκνωμα (DC)**

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπ.

& Τροφ.: 60335/11-9-2012

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Difenoconazole 6% β/ο,

Cyflufenamid 3% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 91,2% β/β

**Μυκητοκτόνο με προστατευτική  
και θεραπευτική δράση.**

**Καταπολέμα το ωίδιο στο  
οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο αμπέλι.**

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Phyteurop, FRANCE

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

**500 ml e**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:**  
Δεν απαιτείται.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το Dynali περιέχει τα δραστικά συστατικά difenoconazole και cyflufenamid.

Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMS) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης. Το Cyflufenamid έχει ένα μοναδικό τρόπο δράσης, παρεμποδίζει την πρωτογενή ανάπτυξη μυκηλίου και της μυκητικής ηλιάς (haustoria) καθώς επίσης και την δευτερογενή ανάπτυξη μυκηλίου και σποριογένεσης. Ανήκει στην ομάδα FRAC U6. Ο βιοχημικός τρόπος δράσης δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αλλά δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες γνωστές κλάσεις μυκητοκτόνων. Επομένως το Dynali μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DIMs.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2.**

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:**

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε αεριζόμενη αποθήκη και σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια:** 21 ημέρες.

**Φάσμα δράσης:**

**Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** Για ωίδιο (Erysiphe necator) 50-65 κ.εκ./100 ψεκ. υγρού ή 65 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος, προληπτικά σε προγράμματα ψεκασμών ή όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από το στάδιο του 3ου φύλλου ως και το στάδιο που η ράγα αρχίζει και αποκάτ το χαρακτηριστικό, για την κάθε ποικιλία χρώμα, BBCH 13-83. 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών.

**Παρατηρήσεις:** Το εύρος δόσης είναι ανάλογο της αναμενόμενης πίεσης προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και αναμένεται υψηλή πίεση προσβολής.



**Αρ. Παρτίδας:**  
**Ημ/νία Παραγωγής:**