




spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Αγιάνερο: Κοκκοδό (Cassida spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.
• Προπύλα: Προπύλα (Spodoptera litura), Αφίδες (Anuraphis cardui, Myzus persicae). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.
• Πατάτα: Δουρνιφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Βαμβάκι: Κοκκοδό (Cassida nebulosa). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Τσιβιόλη: Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πρόανο σκουλήκι (Helicoverpa armigera). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Αλεκυρότης: Βελτισία tabaci), Τζιτζίκια (Empoasca spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρέμμα.
Σελίδα 10

Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Αφίδα (Aphis gossypii), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρέμμα.
• Καννός: Θρίπας (Thrips tabaci), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.
• Ζαχαροτεύλη, Σέσκουλο, Ποντζάρι: Αφίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Μύγα των τεύλων (Pegomya spp.), Άλχη (Osteodonta fabae), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Κασσίδα (Cassida nebulosa): Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Αραβοσίτας*:** Πυραυλάδα (Ostrinia nubilalis), Σέσκια (Sesamia nonagriodes), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera litoralis), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Βαμβάκι: Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πρόανο σκουλήκι (Helicoverpa armigera). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Αλεκυρότης: Βελτισία tabaci), Τζιτζίκια (Empoasca spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρέμμα.
Σελίδα 11

Δόση: 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
ΣΙΤΗΡΑ
• Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.)
• Μήδικη: Αφίδα των μηδικών (Acyrthosiphon pisum), Σκαβάρη των μηδικών (Aphis fabae), Φυτονιάς (Hypera postica). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 25 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40 λίτρα/στρέμμα.
• ΚΑΛΑΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Αφίδες (Myzus spp.), Θρίπες (Thrips tabaci). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 70 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.
• ΚΑΛΑΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Αφίδες (Myzus spp.), Θρίπες (Thrips tabaci). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 70 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.
• Αλεκυρότης: Βελτισία tabaci), Τζιτζίκια (Empoasca spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρέμμα.
• Αραβοσίτας*:** Πυραυλάδα (Ostrinia nubilalis), Σέσκια (Sesamia nonagriodes), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera litoralis), Κοκτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Βαμβάκι: Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πρόανο σκουλήκι (Helicoverpa armigera). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρέμμα.
• Αλεκυρότης: Βελτισία tabaci), Τζιτζίκια (Empoasca spp.). Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοοαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρέμμα.
Σελίδα 12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•ΤΡΟΠΟΣΧΗ: Στη μηλοειδή ή δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100hl/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνά τα 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
•Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργη αμειλοφύλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
*****Η εφαρμογή του Decis 2.5 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπτώσεων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp. στην περίπτωση που προσβολή αυτή υπάρχει.**
Ειδικές συνθήκες γεωργικής, αυτοϊσχύας & περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλκευτεί.
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
**•Χρήση καλμεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθούν οι απώλειες των εραργωμένων στις απολύτως απαραίτητες να αποκατασταθούν.
•Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υποσχεμένα όρια οικονομικής ζημίας.
•Το σκευάσμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
•Να αποφευχθούν οι διαδικασίες εφαρμογής με Decis. Το σκευάσμα να εφαρμόζεται σε εντολή ή με εντομοκτόνο από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
•Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εξελιδιώντόπων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενογράφου πλάκας, ειδικό σύστημα μεροδομής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα δεδομένημεν αντίθετη ανεκτικότητα.
Σελίδα 13**

•Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μεμονωμένης αποδοτικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκευάσματα διαφορετικής ομίχδας.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΕΞΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέι-φρουτ, Νερατζιά, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Ελιά, Ζαχαροτεύλη, Σέσκουλο, Ποντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1
ΑΚΡΟΔΑΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιυδιανά, Μουσουλιά, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σπανάκι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, ΨΥΧΑΝΘΗ (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια), Μπιζέλια, Βαμβάκι, Μήδικη: 2
•Αμπέλι, Φρούδια (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), ΚΟΛΟΚΥΘΩΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκίτι, Πεπόνι, Καρπούζι), Μαρούλι (Υπαίθρου), Αγιάνερο, Πατάτα, Καννός, Αραβόσιτος, Καλαμπόκι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Θερμοκηπίου (Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα): 4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:
•Βαμβάκι, Ζαχαροτεύλη, Σέσκουλο, Ποντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέι-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος: 30 ημερές
•Μήδικη: 14 ημερές
•Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καννός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κιυδιανά, Μουσουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά,
Σελίδα 14

Βυσσινιά: 7 ημερές
•Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φρούδια, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκίτι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Αγκινιέρες, Σπανάκι: 3 ημερές.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοπαθικό άρα δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή των εμειλωμένων στο προϊόν, Σε περίπτωση κατάψης να μην προκληθεί εμπόδος. Ζήτησε αμέσως ιατρική συμβουλή & δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
ΑΠΟΚΛΙΝΕΤΕΣ - ΑΝΤΙΩΤΟ:
Αποκρίνονται τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εσπασής: Μετακινήστε τον αέρινο αέρα από το πρόσωπό σας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που γράν αν επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλύντε αμέσως με σαπούνι ή με νερό.
Αν διακουν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφισβήτηση συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Στεγνίστε τα αμέσως, πλύντε καλά με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάψσης: Μην προκαλείτε εμπόδος.
Παραφορμίες για το νεαρό: Διαπιστωθεί μετά.
Επίπονες χειρουργίες: Συμμετοχή στην καινοπονητική θεραπεία.
Μετά από επαφή με τα μάτια ενδοφθαλμική τοπική ανακούφιση σταγόνων t.i.v. 1%
Αντιπαραση ΗΥποφθάλμια: Χρησιμοποιήστε ανάλογα των χειρουργιών.
Αντιπαραση αντιπαραση σταγόνων.
Χρησιμοποιήστε διαζερμ για ενήλικες S-10 mg ενδοφθάλμιας δόσε χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί την οπτική όραση, να πάει 2,5 mg ενδοφθάλμια.
Αντενδείξεις: Απορρίψτε και παραγμένα αδρανώς.
ΤΗΛΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΤΗΡΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Σελίδα 15

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
•Μην τρώτε, μην πιείτε ή καπνίζετε όταν τα χρησιμοποιείτε.
•Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
•Φοράτε κατάλληλα γάντια και οικιακή προστασία ματιών/προσώπου.
•Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάδοσή τους επικινδύνους απόβλητα.
Απορρίψτε την εμειλωμένη του στο προϊόν.
Σε περίπτωση κατάψης να μην προκληθεί εμπόδος. Ζήτησε αμέσως ιατρική συμβουλή & δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
ΑΠΟΚΛΙΝΕΤΕΣ - ΑΝΤΙΩΤΟ:
Αποκρίνονται τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εσπασής: Μετακινήστε τον αέρινο αέρα από το πρόσωπό σας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που γράν αν επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλύντε αμέσως με σαπούνι ή με νερό.
Αν διακουν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφισβήτηση συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Στεγνίστε τα αμέσως, πλύντε καλά με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάψσης: Μην προκαλείτε εμπόδος.
Παραφορμίες για το νεαρό: Διαπιστωθεί μετά.
Επίπονες χειρουργίες: Συμμετοχή στην καινοπονητική θεραπεία.
Μετά από επαφή με τα μάτια ενδοφθαλμική τοπική ανακούφιση σταγόνων t.i.v. 1%
Αντιπαραση ΗΥποφθάλμια: Χρησιμοποιήστε ανάλογα των χειρουργιών.
Αντιπαραση αντιπαραση σταγόνων.
Χρησιμοποιήστε διαζερμ για ενήλικες S-10 mg ενδοφθάλμιας δόσε χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί την οπτική όραση, να πάει 2,5 mg ενδοφθάλμια.
Αντενδείξεις: Απορρίψτε και παραγμένα αδρανώς.
ΤΗΛΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΤΗΡΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Σελίδα 16

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΥΜΜΕΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
•Μην ρυπάνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
•Το να προστεθεί στους υδρόβιους οργανισμούς νερό αφιέρει μια ανεξέλεγκτη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επηρεασικά ύδατα για τις δένδρδικες καλλιέργειες και την ελιά. 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και την ελιά. 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και την ελιά. 20 μέτρων για τα λαχανικά και τις λαϊκές καλλιέργειες στον αγρό.
•Το να προστεθεί με τη συσκευασία αρθρόποδα να αφιέρει μια ανεξέλεγκτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωμετρική.
•ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Για να προστεθείτε της μέλισσας και άλλα έντομα επικινδύνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιεργείες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζώων.
Αποκρίνονται ή και καταστρέφει τα ζώα πριν την ανθοφορία του.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
•Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις καλλιέργειες τους για ένα μέρο εξασφαλίζοντας τροφή και νερό ενόχς της κωμικής ή να απομακρυνθούν οι καλλιές σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.
Σελίδα 17

