Αριθμός σχεδίου 4
Φ 50

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

page 06

page 07

page 08

page 09

BAYER

decis protech 15 EW

800 κ.εκ.

Ap. Έγκρ. Κ.κλ.Υ.Α.Α.Τ.: 14346/17-2-2010

Γαλακτωματοποιημένο λάδι σε νερό (EW)
Εγγ. ανάθεση: deltamethrin 1.5%,β/ο,
Βοηθ. ουσίες: 98,51%,β/β

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο
επαφής και σπαράγου για την αντιμετώπιση μαζτήκων και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφύλαξη μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

L.05.2015.11

9 200309 847107

Σελίδα 1

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΤΕΣΙΣ ΠΡΟΤΕΚ 15EW
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθροειδές: εντομοκτόνο επαφής και σπαράγου για την αντιμετώπιση μαζτήκων και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον ανοδεσμό σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:
•Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρούτ, Νεραντζά:
Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. ανεκαμμένο/100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
Λεκάνιο (*Saissetia oleae*), Μίνγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
ΑΚΡΟΔΡΥΑ:
•Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρύδια, Καστανά:
Αφίδες (*Hyalopterus spp.*), Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Laspeyresia pomonella*), Καρπόκαψα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (70-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα / στρέμμα.
Δόση: 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (70-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*). Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ:
•Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά:
Καρπόκαψα της Μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*), Ψύλλα Μηλιάς (*Psylla mali*), Αφίδες (*Aphis pomi, Dysaphis plantaginea*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80* κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 - 140 λίτρα / στρέμμα.
Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.
Ψύλλα Αχλαδιάς (*Psylla pyri*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:
•Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά:
Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.
Ραγιολέπιδα (*Rhagoletis cerasi*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 65-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (65-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.
Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.
Αφίδες (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni*), Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα / στρέμμα.
•ΑΜΠΕΛΙ:**
Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. (1η γενεά), 80-115 κ.εκ. (2η και 3η γενεά) σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
Κοχυλίδα (*Cysia ambiguella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80-115 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
Τζιτζικάκια (*Empoasca spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.

Σελίδα 2

Σελίδα 3

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Σελίδα 7

Σελίδα 8

Σελίδα 9

Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Θρίπας (*Thrips angusticeps*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
•Αγγινάρα:
Κασσίδα (*Cassida spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
Προνύπεια (*Spodoptera litura*), Αφίδες (*Anuraphis cardui, Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα.
•Πατάτα:
Δυρινόχαρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.
Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.
•Βαμβάκι:
Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80-115 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.
Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάκια (*Empoasca spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.
Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδα (*Aphis gossypii*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα / στρέμμα.
•Καπνός:
Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.
•Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι:
Αφίδες (*Aphis fabae, Myzus persicae*), Μύγα των τευτλών (*Pegomya spp.*), Αλίτης (*Chaetocnema tibialis*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.
Κασσίδα (*Cassida nebulosa*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα / στρέμμα.
•Αραβόσιτος*:**
Πυραυλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζίμια (*Sesamia nonagrioides*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.
Diabrotica virgifera. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα / στρέμμα.
ΣΙΤΗΡΑ:
•Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη:
Αφίδες (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*), Κοφτοκαψάλκης (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα / στρέμμα.
•Μηδικές:
Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrthosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*), Φυτονόμος (*Hypera postica*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 40 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40 λίτρα / στρέμμα.
•ΚΑΛΛΙΠΣΤΙΚΚΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):
Αφίδες (*Myzus spp.*), Θρίπες (*Thrips tabaci*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (40-80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.
Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 115 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα / στρέμμα.
Φυλλοδέτες (*Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (30-60 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Σελίδα 10

Σελίδα 11

Σελίδα 12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 80κ.εκ. σκευάσματος /Ηl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100lt / στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπεράνει τα 80 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.
Σε διοφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
**Δεν επιτρέπεται η συγκομβή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
***Η εφαρμογή του Decis Protech 15 EW στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτιμούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

Ειδικές Συνθήκες Γεωργικές, Φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
•Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυτικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
•Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
•Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
•Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Decis. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
•Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών / στόχων με τη χρήσιμη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
•Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρούτ, Νεραντζά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι, **ΣΙΤΗΡΑ** (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1.
ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρύδιά, Καστανιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σπανάκι, Μαϊντανός , Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, **ΨΥΧΑΝΘΗ** (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια), Μπιζέλια, Βαμβάκι, Μηδικές: 2.
•**Αμπέλι, Φράουλα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Σαλανιώδη Υπαίθρου (Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα) Καλοκυνθοειδή Υπαίθρου & Θερμοκηπίου (Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκυθάκι - Πεπόνι - Καρπούζι), Μαρούλι, (Υπαίθρου), Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Καλλωπιστικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)**: 3.
•**Σαλανιώδη Θερμοκηπίου (Πιπεριά - Τομάτα - Μελιτζάνα)**: 4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
•**Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρούτ, Νεραντζά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος**: 30 ημέρες.

Σελίδα 13

Σελίδα 14

Σελίδα 15

•**Μηδικές**: 14 ημέρες.
•**Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά**: 7 ημέρες.
•**Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Αγκινάρες, Σπανάκι**: 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτόξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υφιστάμενος που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Παρομένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

Σελίδα 15

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΣ: • **Φυλάξτε το κλεισμένο, μακριά από παιδιά.** • **Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.** • **Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.** • **Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.** • **Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.** • **Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκαλέσετε εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα του.**
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και αποχέψτε το ασφαλώς. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μ εταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξεπλυμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε ιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Θνάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το φυσικό δέλμμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα σπάνιοι κρέμα βεταμίνες Ε ή από γαλακτωμα. Εάν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το μάτι:** Ξεπλύνετε τα αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ιατρό. **Πληροφορίες για το ιατρό:** Θεραπευτικά μέτρα: Επιπόπιος χειρισμός: Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με το μάτι με μέτρα εκπλύσεις τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορήγησε αναλγητικά εάν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντιμετώπιση σπασμών: Χορήγηστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβιως ώσο χρειαζέται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία, για παιδιά 2,5 μg ενδοφλέβιως.
Αντενδείξεις: Ατροπίνη και παράγωγα αδρενιαλίνης.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777.

Σελίδα 16

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
• **Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**
• **Γι α να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μαν ανέγκιστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα γα τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, 20 μέτρων γα την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων γα τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό.**
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΕΚΑΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΣ ΜΕΛΕΣΣΕΣ.
Γα να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά τη περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή κα κατεστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που αι μέλισσες συλλέγουν.
• **Μετά την εφαρμογή αι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους γα μα μέρα ξεφορτώζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν αι κυψέλες.**

Bayer CropScience

Διανομείς:
Bayer Ελλάς ABEE
Σαρρή 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

9 200309 847107

Σελίδα 17

BAYER

decis protech 15 EW

800 κ.εκ.

Ap. Έγκρ. Κ.κλ.Υ.Α.Α.Τ.: 14346/17-2-2010

Γαλακτωματοποιημένο λάδι σε νερό (EW)
Εγγ. ανάθεση: deltamethrin 1.5%,β/ο,
Βοηθ. ουσίες: 98,51%,β/β

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο
επαφής και σπαράγου για την αντιμετώπιση μαζτήκων και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφύλαξη μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

L.05.2015.11

9 200309 847107

Σελίδα 18