

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επίστρε. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελητίο δεδομένων ασφαλείας. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. - Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας υποδειχθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από ιατρό. Ποτέ μην προκαλέτε εμετό ή χορηγείτε οπιοειδή από το στόμα όταν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή εκδηλώνει σπασμούς.

- Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σε μορφή βρέξιμης σκόνης.

Δεν συνδυάζεται με πολλούς ορυκτελαίους και αλκαλικά σκευάσματα, όπως βορ-
διγέλιο πολτό. Επίσης να μην χρησιμοποιείται θερινός πολτός λίγο πριν ή αμέ-
σως μετά την εφαρμογή του DELAN 50 SC, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν στίγ-
ματα στους καρπούς.

Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με αρκετά υγρά σκευάσματα, εκτός των dicofol και
dinoscar γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν στίγματα στους καρπούς.
Συνδυάζονται με μυκητοκτόνα της ομάδας των αζολών καθιστώντας αποτελεσματικό-
τερο και μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστι-
κού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινούμε καλά τη φιάλη που περιέχει το
σκεύασμα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συ-
μπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την αναδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Μηλιά, Αχλαδιά: 21 ημέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 28 ημέρες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι συσκευασίες ξεπλύνονται με τριπλό ξέ-
πλυμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και, στη συνέχεια, τα
υλικά συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη δι-
ασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενυποθίζονται σε σημεία συλλογής για διαχεί-
ριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς
καυστήρες για αγροχημικά.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερ-
μοκρασία ως 35°C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό
για δύο (2) χρόνια.



DELAN® 50 SC

Dithianon (Ντιθιανόν) 50%

Συμπυκνωμένο Ελαιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Dithianon 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 54.8% β/β

Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Επιβλαβές, κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 6635/11-4-1996

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 700 κ.εκ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Wädenswil Branch, Ελβετία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860130,
www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agri-Production, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος,
Θεσσαλονίκη. © Σήμα κατατεθέν BASF

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συνιστώνται φεκασμοί καλύψεως. Οι δόσεις αναφέρονται σε κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερό.
1. **ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ:** Για *Φουζικλάδιο*. Δόση: 120 (πριν την άνθηση), 75 (με-
τά την άνθηση). Συνιστώνται φεκασμοί: α) στο στάδιο της πράσινης κορυφής, β) της ρό-
δινης κορυφής, γ) της πτώσης των πετάλων, δ) 10-15 ημέρες αργότερα (καρπιδίο). Για
Φαιά Σήψη. Δόση: 100-150. Συνιστώνται εφαρμογές κατά την έκπτυξη των σφαλμών,
στο στάδιο της λευκής ή ρόδινης κορυφής, στην πλήρη άνθηση. Για *Σήψη Καρπών*.
Δόση: 100-150. Συνιστώνται εφαρμογές το καλοκαίρι, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. **Ογκος φεκαστικού υγρού:**
100-200 λίτρα ανά στρέμμα. 2. α) **ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Για *Φαιά
Σήψη*. Δόση: 140. Συνιστώνται 2 φεκασμοί στο στάδιο της ρόδινης κορυφής και στην ά-
νθηση. Για *Καρύνεο*. Δόση: 120-140. Συνιστώνται 2 εφαρμογές: (α) το φθινόπωρο (πτώ-
ση 75% των φύλλων) ή το χειμώνα πριν τη διόγκωση των σφαλμών και (β) την άνοιξη,
στην έναρξη της βλάστησης. Για *Εξίσασκο*. Δόση: 120-140. Συνιστάται ένας φεκασμός
κατά την περίοδο του χειμερινού ληθάργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των
σφαλμών. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Ογκος φεκα-
στικού υγρού:** 150 λίτρα ανά στρέμμα. β) **ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΗΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Για *Φαιά Σήψη*.
Δόση: 50. Συνιστώνται 2 φεκασμοί στο στάδιο της ρόδινης κορυφής και στην άνθηση.
Για *Καρύνεο*. Δόση: 50. Συνιστώνται 2 εφαρμογές: (α) το φθινόπωρο (πτώση 75% των
φύλλων) ή το χειμώνα πριν τη διόγκωση των σφαλμών και (β) την άνοιξη, στην έναρ-
ξη της βλάστησης. Για *Εξίσασκο*. Δόση: 50. Συνιστάται ένας φεκασμός κατά την περι-
οδο του χειμερινού ληθάργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των σφαλμών.
Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. **Ογκος φεκαστικού υγρού:**
150 λίτρα ανά στρέμμα. 3. **ΑΜΠΕΛΙ:** Για *Περωνόσπορο*. Δόση: 120-150. Συνιστώνται οι
εξής εφαρμογές: α) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., β) μετά από 10 ημέ-
ρες, γ) λίγο πριν την άνθηση και δ) λίγο μετά την γονιμοποίηση. Για *Φώμοση*. Δόση:
150. Συνιστώνται 3 εφαρμογές: α) κατά την έκπτυξη των σφαλμών, β) αμέσως μετά το
σχηματισμό του 1ου φύλλου, γ) στο στάδιο των 2-3 φύλλων. **Μένιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4. **Ογκος φεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμ-
μα. 4. **ΛΥΚΙΣΚΟΣ:** Για *Περωνόσπορο*. Δόση: 90-150. Συνιστώνται 4 φεκασμοί: α) όταν
ο βλαστός βρίσκεται στα ¾ της διαδρομής τους επί των υποστηρίγμάτων, β) όταν οι
βλαστοί φτάσουν στην κορυφή των υποστηρίγμάτων, γ) λίγο πριν την άνθηση και δ)
αμέσως μετά την άνθηση. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.
Ογκος φεκαστικού υγρού: 250 λίτρα ανά στρέμμα. 5. **ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ** για *Σεπτορίωση*,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ για *Μελανή Κηλίδωση των Φύλλων*. Δόση: 150. Συνιστώνται προ-
ληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προ-
βλεπής. **Ογκος φεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) Στο φουζικλάδιο, εκτός από προστατευτικά, δρε και θεραπευτικά
εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από την
βροχή που την προκαλεί). Β) Στις καλλιέργειες μηλοειδών, αμπελιού και πυρηνοκαρ-
πων να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών
προειδοποιήσεων. Γ) Δεν διασπώνται εύκολα, γι'αυτό μετά τους πρώτους φεκασμούς
να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου
πάνω στο φύλλωμα των φυτών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις ποικιλίες μηλιάς με ανοιχτόχρωμο καρπό (π.χ. Golden
Delicious) οι εφαρμογές πρέπει να σταματούν 2 μήνες πριν τη συγκομιδή γιατί μπο-
ρεί να προκαλέσει κηλίδωση καρπών. Στις ποικιλίες αχλαδιάς, Δουκέσσα και Ουιλιάνας
να εφαρμόζονται χαμηλές δόσεις και μετά από δοκιμή γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτο-
ξικότητας.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας

