

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και οι περιέκτηί του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως στον καθαρό αέρα και εάν χρειαστεί κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι τουλάχιστον για 15-20 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα με πόσιμο νερό, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΥ: Εάν η καταποθείσα ποσότητα ήταν μικρή ή αν έχει προκληθεί εμετός ή έχετε περάσει αρκετός χρόνος από την κατάποση, προτείνεται η χορήγηση ενεργού άνθρακα ή σορβιτόλης από στόματος. Εάν η καταποθείσα ποσότητα ήταν μεγάλη και έχει περάσει μέχρι μία ώρα από την κατάποση, προτείνεται η γαστρεντερική απολύμανση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 7793777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: • Στις ποικιλίες μηλιάς με ανοιχτόχρωμο καρπό (π.χ. Golden Delicious) οι εφαρμογές πρέπει να σταματούν 2 μήνες πριν τη συγκομιδή γιατί μπορεί να προκαλέσει κηλίωση καρπών. • Στις ποικιλίες αχλαδιάς, Δουκέσσα και Ουίλιαμς να εφαρμόζονται χαμηλές δόσεις και μετά από δοκιμή γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με λόδια ή παλτούς. Η χρήση λαδιών ή πολτών επιτρέπεται 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή DELAN 70 WG.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 21 ημέρες. Λοιπές καλλιέργειες: 28 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριτύτερη για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενυποθιούνται σε σημεία συλλογής για διαχείριση σαν επικινδύνους απόβλητα. Τα προϊόν εξουδετερώνονται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αεροχρημικά.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, καλά αεριζόμενο, δροσερό (θερμοκρασία 20-30°C) και μακριά από πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

BASF
The Chemical Company

DELAN® 70 WG

Dithianon (ντιθιανόν)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: dithianon 70% β/β (χημική ομάδα: κινόνες)
Βοηθητικές ουσίες 24.7% β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο, θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 6956/4-5-2004

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 500 γραμ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Ελβετία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Italia.

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Οι δόσεις αναφέρονται σε γραμμάριο ανά 100 λίτρα νερό.
1. ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ: Για **φουζικλάδιο** κάνετε εφαρμογές: α) στην πράσινη κορυφή, β) στη ρόδινη κορυφή, γ) στην πτώση των πετάλων, δ) 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). Δόση: 80 (πριν την άνθηση), 50 (μετά την άνθηση). Για **φαιά σήψη** κάνετε εφαρμογές κατά την έκπτυξη των σφαλαμών, τη λευκή ή ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθηση. Δόση: 75-100. Για **σμήγιες καρπών** (*Gloesporium spp.*, *Physalospora spp.*) κάνετε εφαρμογές το καλοκαίρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 75-100. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα ανά στρέμμα.
2. α) ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Για **φαιά σήψη** κάνετε εφαρμογές: α) στη ρόδινη κορυφή και β) στην άνθηση. Δόση: 100. Για **κορύνεο** κάνετε 2 εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, κατά την πτώση του 75% των φύλλων, ή το χειμώνα, πριν τη διόγκωση των σφαλαμών και β) την άνοιξη, στην έναρξη της βλάστησης. Δόση: 80-100. Για **εξώασκο** κάνετε μία εφαρμογή κατά την περίοδο του χειμερινού ληθάργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των σφαλαμών. Δόση: 80-100. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα ανά στρέμμα.
β) ΚΕΡΑΣΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Για **φαιά σήψη** κάνετε 2 εφαρμογές: α) στη ρόδινη κορυφή και β) στην άνθηση. Δόση: 35. Για **κορύνεο** κάνετε 2 εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, κατά την πτώση του 75% των φύλλων, ή το χειμώνα, πριν τη διόγκωση των σφαλαμών και β) την άνοιξη, στην έναρξη της βλάστησης. Δόση: 35. Για **εξώασκο** κάνετε μία εφαρμογή κατά την περίοδο του χειμερινού ληθάργου και οπωσδήποτε πριν από τη διόγκωση των σφαλαμών. Δόση: 35. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα ανά στρέμμα.
3. ΑΜΠΕΛΙ: Για **περονόσπορο** κάνετε εφαρμογές που αρχίζουν: α) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., β) μετά από 10 ημέρες, γ) λίγο πριν την άνθηση, δ) λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση: 80-100. Για **φώμοση** κάνετε 3 εφαρμογές: α) κατά την έκπτυξη των σφαλαμών, β) αμέσως μετά το σχηματισμό του πρώτου φύλλου, γ) στο στάδιο των 2-3 φύλλων. Δόση: 100. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.
4. ΛΥΚΙΣΚΟΣ: Για **περονόσπορο** κάνετε εφαρμογές: α) όταν οι βλαστοί βρίσκονται στα 3/4 της διάρκειας τους επί των υποστηρίγμάτων, β) όταν οι βλαστοί φτάσουν στην κορυφή των υποστηρίγμάτων, γ) λίγο πριν την άνθηση, δ) αμέσως μετά την άνθηση. Δόση: 65-100. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 250 λίτρα ανά στρέμμα.
5. ΧΡΥΣΑΝΘΕΟ: Για **σεπτοριώση** κάνετε προληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 100. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Για **μελανή κηλίωση των φύλλων** κάνετε προληπτικές εφαρμογές και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 100. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Στο φουζικλάδιο εκτός από προστατευτικά δρο και θεραπευτικά εφόσον χρησιμοποιηθεί εγκαίρως μέσα σε 48 ώρες από τη μόλυνση (δηλαδή από τη βροχή που την προκαλεί). Β. Στις καλλιέργειες μηλοειδών, αμπελιού και πυρηνοκάκπων, να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων. Γ. Δεν διασπάται εύκολα, γι' αυτό μετά τους πρώτους ψεκασμούς να εφαρμόζονται οι μικρές δόσεις, γιατί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα του φαρμάκου πάνω στο φύλλωμα των φυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινούμε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέτουμε με την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Παραγωγής: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Λήξης: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας.

