

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ /στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτ./στρ.	
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη	Ετήσια ζιζάνια* (πλατύφυλλα)	85-120	40-60	Στάδιο της καλλιέργειας: Από το τέλος του αδεφώματος μέχρι την αρχή του καλαμώματος (πρώτο κόμβο)
	Πολυετή ζιζάνια* (πλατύφυλλα)	120-150		
Γκαζόν	Ετήσια ζιζάνια* (πλατύφυλλα)	85-120	40-60	Στάδιο της καλλιέργειας: Την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο
	Πολυετή ζιζάνια* (πλατύφυλλα)	120-150		

Παρατηρήσεις:

1. Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
2. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται από το μπομποοίκιο μέχρι λίγο πριν από την άνθηση.
3. Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (*Cirsium arvense*) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει 15 – 20 εκ. ύψος.
4. Οι μεγαλύτερες δόσεις και ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα.
5. Μην ψεκάζετε πριν το αδέλωμα ή μετά την έναρξη της επιμύκησης του στελέχους.
6. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
7. Σε εγκατεστημένο γκαζόν 6 μήνες μετά τη σπορά.
8. **Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμώδη εδάφη και υψηλό επίπεδο βροχόπτωσης.**

* **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Ετήσια πλατύφυλλα: Αγριομελίτζανα (*Xanthium strumarium*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αλμυρίδι (*Salsola kali*), Ασπράγκανο (*Xanthium spinosum*), Βλήτα (*Amaranthus* spp.), Ήμερο ανάπι (*Sinapis alba*), Λωχός (*Sonchus* spp.), Θλάσι (*Thlaspi* spp.), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Σισυμπίριο (*Sisymbrium irio*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Ρανονκούλος (*Ranunculus arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*).
Πολυετή πλατύφυλλα: Κίριοιο (*Cirsium arvense*), Λάπαθα (*Rumex* spp.), Περιπούλαδα (*Convolvulus arvensis*)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: --

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μετωποεπιφανειακός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε υπεκ τύπου σκούπας και ψεκαστό με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακλόνη ή ακαθάρτο νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άθουνο νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνδυαστικότητα: ---

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων ζιζανίων στο 2,4-D.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιπλοή και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστολή των φυλλών και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την ανάπτυξη, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αζίνες.

DESORMONE® 60SL

2,4-D Οξύ 600 g/l
(υπό μορφή 2,4-D άλατος διμεθυλαμίνης 722,4 g/l)
Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

2,4-D Οξύ 60% β/ο (υπό μορφή 2,4-D άλατος διμεθυλαμίνης 72,24 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 37,08% β/β

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 7528/25-01-2008

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών, για την καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη) και γκαζόν.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΧΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος έγκρισης - Παρασκευαστής σκευάσματος -

Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας σκευάσματος:

NUFARM GmbH & Co KG, St. Peter Strasse.25, A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

Μεσογειών 467 & Γούναρη 40, 15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 2106990932, Fax: 2106990862, E-mail: info@gr.nufarm.com

Διανομέας:



NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 & Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Αθήνα, Τηλ.: 210 6889777-8

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον και αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άθουνο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν ο παθών έχει πλήρως τις αισθήσεις του προκαλέστε εμετό αμέσως δίνοντας του να πει δύο ποτήρια νερό και βάζοντας το δάκτυλο βαθιά στο λαιμό. ΜΗ χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα από τον χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Πληροφορίες για τον γιατρό: Συνιστάται πλύση στομάχου με επανειλημμένη χορήγηση διαλυμάτων ενεργού άνθρακα και συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας. Για την καρδιακή αρρυθμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί θειική κινιδίνη (quinidine sulphate). Προσοχή στη χορήγηση και στις δόσεις σκευασμάτων αδρεναλίνης. Δεδομένου ότι αποβάλλεται δια μέσου των νεφρών, συνιστάται η διάλυση του καθώς και έλεγχος της ισορροπίας νερού και ηλεκτρολυτών.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη (SPE 3)
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφανείες): Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευόμενο από τη ζέση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 – 25°C) και όχι κάτω από 0° C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: