

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ:

1. ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ. Για **φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*, *V. pyrina*) κάνετε ψεκασμούς από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Το μεσοδιάστημα των εφαρμογών είναι 7-10 ημέρες, σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του DITHANE 75 WG με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole, ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του DITHANE 75 WG πρέπει να μεσολαβεί μεσοδιάστημα 14 ημερών. Δόση: 150-200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4, εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρέμμα.

2. ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες). Για **περονόσπορο** (*Plasmopara viticola*) κάνετε 4 ψεκασμούς φυλλώματος με μεσοδιάστημα 10 ημερών, εφόσον απαιτείται. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα /στρέμμα.

3. ΚΑΡΟΤΟ. Για **αλτερναρίωση** (*Alternaria dauci*) ψεκάστε από το στάδιο του φυταρίου και συνεχίστε με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

4. ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΟ (ΕΣΑΛΟΤ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Για **σκωρίαση** (*Puccinia allii*) κάνετε ψεκασμούς φυλλώματος από το 2^ο φύλλο και έπειτα, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα /στρέμμα.

5. ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Για **περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*) και **αλτερναρίωση** (*Alternaria solani*) κάνετε προληπτικούς ψεκασμούς, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου κι έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών είναι ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρέμμα.

6. ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Για **αλτερναρίωση** (*Alternaria solani*) κάνετε προληπτικούς ψεκασμούς, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου κι έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών είναι ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρέμμα.

7. ΚΟΛΟΚΥΝΘΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (κολοκυθάκι, κολοκύθα, πεπόνι). Για **περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*) κάνετε ψεκασμούς φυλλώματος από το στάδιο του 5^{ου} φύλλου κι έπειτα με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα /στρέμμα.

8. ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Για **περονόσπορο** (*Bremia lactucae*) ψεκάστε από το στάδιο των φυταρίων (BBCH 12) και συνεχίστε με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.

9. ΠΑΤΑΤΑ. Για **περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*) και **αλτερναρίωση** (*Alternaria solani*) κάνετε ψεκασμούς φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών. Εφαρμόστε το προστατευτικά από το φύτρωμα κι έπειτα. Τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών είναι ανάλογα με την πίεση της ασθένειας. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει μετά από βροχή ή άρδευση πριν εφαρμόσετε το σκεύασμα. Δόση: 200 γραμ. ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 8 με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-80 λίτρα /στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α) Το DITHANE 75 WG είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.

Β) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

Γ) Σε περίπτωση χρήσης του DITHANE 75 WG, τα αμπελόφυλλα να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το DITHANE 75 WG πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

2. Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό αν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των λαχανικών και της πατάτας, 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 30 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

BASF
The Chemical Company

Dithane® 75 WG

Mancozeb (Μανκοζέμπ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Mancozeb 75% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες 16% β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60275 / 29-7-2010

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **1** κιλό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Indofil Industries Limited, Ινδία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Indofil Industries Limited, Via Filippo Turati, 6 – 20121 Milan, Ιταλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Indofil Industries Limited, Ινδία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν Indofil Industries Limited in Europe.



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ, αναδεύετε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση 0.03%), αναδεύετε για 2 λεπτά και γεμίστε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από σωληνώσεις και βραχίονες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μπεκάκια αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να προκαλέσει σκωρίochρωση σε μηλιές ποικιλίας «Golden Delicious». Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες αχλαδιάς Βουτουράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Στα μηλοειδή, το DITHANE 75 WG μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα INDAR 5 EW και SYSTHANE 6 SC.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις πολυετών καλλιιεργειών. Γενικά, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Κρεμμύδι - Ασκαλώνιο (Εσαλότ) - Μαρούλι (υπαίθρου): **28** ημέρες
Τομάτα - Μελιτζάνα - Πιπεριά - Κολοκυθάκι - Κολοκύθα - Πεπόνι (υπαίθρου): **3** ημέρες
Πατάτα: **7** ημέρες

Καρότο: **30** ημέρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά υλικά συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο, ξηρό χώρο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

