

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Αποφεύγετε να αναπνεύετε συγκεντρωμένες σταγονιδιώδων. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Μαζέψτε τη χυμινή ποσότητα. •Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέλθει στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή να φορά προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξεπλύνετε. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην μοιράνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες ροδάκινα, νεκταρινιά, δαμασκηνιά και κεράσια.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες τομάτα, καρπούζι, καλακούδι, μορούλι, μπρόκολο, κουνουπίδι, αγκινάρα, μηδική και βαμβάκι.
Επικινδύνω για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύλη και νέκταρ. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.
Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία.
•Να μην εφαρμόζεται από 5 ημέρες πριν την άνθηση μέχρι και το τέλος της άνηθης.
•Μην ψεκάζετε φυτά καλυμμένα με μελιτώδη εκκρίματα.
Επικινδύνω για τα μη στακευάσιμα έντομα και άλλα αρθρόποδα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυζητικών και μαστικών εντόμων. Είναι μέγιστο των δραστικών ουσιών thiamethoxam και lambda cyhalothrin.
Το lambda cyhalothrin είναι μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας την είσοδο των ιόντων Na στους νευροκιννοειδών. Το thiamethoxam είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης. Εισέρχεται στα φυτά από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται ακροστολικά.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη όση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντάς και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στις συνέχεια αφού συμπληρωθούν προσηλωμένους με ταυρίνη για τη διαφύλαξη της μη περαιτέρω χρήσης αναποσβεστικά σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Διακρίση ανθεκτικότητας: Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες ή έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτών των πυρεθρινών και των νεονικοτινοειδών.
Μέχρι 2 εφαρμογές σε μία καλλιεργητική περίοδο.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλό αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10°C έως 35°C.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: 28 ημέρες, Ροδάκινα, Κεράσια, Δαμασκηνά, Μορούλι, Μπρόκολο: 14 ημέρες, Αγκινάρα, Μηδική: 7 ημέρες, Τομάτα, Καρπούζι, Καλακούδι, Κουνουπίδι: 3 ημέρες.

Αρ. Παρτίδας:
Η/νία Παραγωγής:



L179652 GREC/5S



Eforia®
0,45 ZC

syngenta®

Thiamethoxam + L-cyhalothrin
ZC μικτής μορφής CS
(μικροκάψουλες σε ελαιώρημα)
και SC (Πυκνό ελαιώρημα)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 14477/9-4-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Thiamethoxam 30 g/L

L-cyhalothrin 15 g/L

Βοηθητικές ουσίες 95,41 % β/β

Εντομοκτόνο για την
καταπολέμηση μυζητικών
και μαστικών εντόμων
σε διάφορες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 ltr

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Επιβαρβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

TM

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μορούλι	Αφίδες (Nasonovia ribisnigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)	100*	-	20-100	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Μπρόκολο Κουνουπίδι	Αφίδες (Aphis sp., Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae) Κάμπιες (Heliothis armigera, Pieris brassicae, Plutella sp., Plutella xylostella, Spodoptera spp.)	100- 125	-	50-150	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Πυρηνόκαρπα •ροδάκινα •νεκταρινιά •δαμασκηνά •κεράσια	Αφίδες (Myzus persicae, Hyalopterus spp.)	150	130	120	2 εφαρμογές κάθε 14 ημέρες
Καρπούζι Καλακούδι	Αφίδες (Aphis gossypii)	100	-	20-120	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Τομάτα	Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) Κάμπιες (Heliothis armigera, Epithrix sp)	100	-	100	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες (Aphis gossypii)	100	-	40-100	2 εφαρμογές κάθε 16 ημέρες
Αγκινάρα	Αφίδες (Myzus persicae), Σποντόπτερα (Spondoptera spp.)	100*	-	80-100	2 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες
Μηδική	Αφίδες (Aphis craccivora, Myzus persicae) Κολεόπτερα (Hypera postica, Colaspidea atrum, Apion pisi)	40	-	30-100	1 εφαρμογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΙΘΙΡΙΕΣ

* Το προϊόν είναι εξειδικευμένο για την καταπολέμηση των αφίδων στην καλλιέργεια του μορούλιου και της αγκινάρας και στην όση των 75 κ.εκ./στρέμμα.