

κόλληση της άνω και κάτω επιφάνειας των φυλλών με το ψεκαστικό υγρό. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/τόπων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικεκοσμούρου πάκας, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανεπιτήρτη ανθεκτικότητα. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. • Χρήση καλυπτηρικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών με ακρεκτόνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναλόγως την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες ξεπλένονται από πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπτά, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Να φοράτε κατάλληλες μπότες. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Αποφύγετε την ενδεχόμενη ρύπανση στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικινδύνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος σε πλάγια (πλευρική) θέση. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε ορθολογικά. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Πληροφορίες για το νατρό-θεραπευτική αγωγή:** πρώτες βοήθειες, συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου, ενεργός άνθρακας και θεϊκό κάρβο. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων ttx, 1% amethocaine hydrochloride. Αυστηρή αποχή από το αλκοόλ για 1-2 εβδομάδες. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΗΣΕΩΝ: 210 7793777.**

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΡΘΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΖΩΟΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μισή αφέσκαφη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για τους σκουλήρες και 5 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφανειακά υδάτα.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μισή αφέσκαφη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τους σκουλήρες από την μη γεωργική γη.

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



Bayer CropScience



Άρ. Εγκ. Κυβλ. Υ.Α.Α.Τ.
2169/18.08.2008

Πυκνό ενσώκρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση: spiridiclofen 24% B/ο
Βοηθ. ουσίες: 76,9% B/β

Ακαρεοκτόνο φυλλώματος,

για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά),
εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδοκανίας
και του αμπελιού από τα ακάρεα.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Υποτίπο καρκινογόνους
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και Σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE



ENVINTOP 240 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ακαρεοκτόνο φυλλώματος, για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδοκανίας και του αμπελιού από τα ακάρεα. Ανήκει στην νέα χημική ομάδα των τετρανυχών οξέων και εμφανίζει ένα τρόπο δράσης (παρεμπλοκής της βιοσύνθεσης λιπιδίων). Δρά αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια των ακάρεων, όμως τα νεοστάδια είναι πιο ευαίσθητα από τα ακαρία. Δρά αποκλειστικά στα θηλυκά ενήλικα άτομα. Ο θάνατος των ακάρεων επέρχεται μετά από 3-7 ημέρες από την εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλλιεργειών φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Μηλιά, Αχλαδιά: Τετρανυχός (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.

Εσπεριδοειδής (Λεμονιά, Πορτοκαλιά):

Τετρανυχός (*Panonychus citi*). Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300 λίτρα/στρέμμα.

Τετρανυχός (*Tetranychus urticae*). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.

Ροδοκανία: Τετρανυχός (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*).

Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι: Τετρανυχός (*Eotetranychus carpini*, *Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (40 κ.εκ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Μηλιά, Αχλαδιά:** Καθολικός ψεκασμός της καλλιεργείας με την έναρξη του 2ου κύματος προσβολής και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς.

Εσπεριδοειδής (Λεμονιά, Πορτοκαλιά), Ροδοκανία, Αμπέλι: Καθολικός ψεκασμός της καλλιεργείας με την έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς.

ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Εσπεριδοειδής (Λεμονιά, Πορτοκαλιά), Ροδοκανία, Αμπέλι: 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Εσπεριδοειδής (Λεμονιά, Πορτοκαλιά), Ροδοκανία, Αμπέλι: 14 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΓΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής. Για την αποφυγή υποβλήσεων των ποικιλών χαρακτηριστικών των προϊόντων μεταποίησης των εσπεριδοειδών και των σταφυλιών η τελευταία εφαρμογή με ENVINDOR να γίνεται 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Για την πρόληψη ή καθυστέρηση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ακάρεων στο ENVINDOR συστήνεται η ακόλουθη στρατηγική:

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο στις προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή με ακρεκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη