

Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	ΔΟΣΗ (κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (λίτρα / στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσπορος	Αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια	100-150 (1)	20-40	Όταν ο Αραβόσπορος έχει 2-8 φύλλα.

Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

Αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Στάριες (*Setaria spp.*), Βέλιουρα (*Sorghum halepense*) από σπόρο ή από ριζώματα.
Πλατυφύλλα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus spp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*)

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: —

Παρατηρήσεις:

(1) Το έδαφος των δόσεων εξαρτάται από το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και ειδικότερα για:

(α) Μουχρίτσα στο στάδιο 1-3 φύλλων, δόση 100 κ.εκ. σκευ. / στρ. στο στάδιο 1-2 αβελώνων, δόση 100-150 κ.εκ. σκευ. / στρ. ανάλογα με τον πληθυσμό της. (β) Βέλιουρα από σπόρο μέχρι 8 φύλλα, δόση 100 κ.εκ. σκευ. / στρ. και από ριζώματα όταν έχει ύψος 10-20 εκ., δόση 125-150 κ.εκ. σκευ. / στρ. ανάλογα με τον πληθυσμό του. (γ) Στάριες και Βλήτα στο στάδιο των 2-4 φύλλων, δόση 100 κ.εκ. σκευ. / στρ. (δ) Τάτουλα στο στάδιο των 2-4 φύλλων, δόση 100-150 κ.εκ. σκευ. / στρ. ανάλογα με τον πληθυσμό του.

*ε) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστάται: σπαστή εφαρμογή ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ. / στρ. και 2η εφαρμογή μετά ~2 εβδομάδες με δόση 50 κ.εκ. σκευ. / στρ.

(2) Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός σπυλμάτων με 20 - 40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα, με τα συνήθη ψεκαστικά του εδάφους. Πίεση ψεκαστικού μικρότερο από 2,5 ατμόσφαιρες (40 psi) και μικρό τύπο σκευάσματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα: Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσπορος βρίσκεται υπό stress υγρασίας καθώς και σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του αραβόσπορου. Το φαινόμενο αυτό είναι συνέπεια της χρησιμοποιούμενης δόσης και παροχής. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο «γλυκό καλομπίκι» και σε αραβόσπο που προσρίζεται για σπόρο. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση κοκκώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να απευθύνεται για σπορά μια εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλοκτόνου με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και:

• Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Esquire 4 SC στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ενοχληθεί μόνο αραβόσπορος.
• Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Για σπόρο χειμώνα σιταρού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας τουλάχιστον 10 μήνες από την εφαρμογή του και αφού προηγηθεί βαθιά άρση.

ESQUIRE® 4 SC

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 4% β/ο Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Nicosulfuron 4,00% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 95,16% β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 7820 / 10-04-2007 / 31-12-2012

**Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο,
για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και
πλατυφύλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης / Παρασκευαστής / Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
NUFARM SAS, 28 boulevard Camelinat, 92230 Gennevilliers, Γαλλία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Ε. Λεφάκη, Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας:

GAT | Microencapsulation, Austria

Διανομή:
ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνός 32, Βούλγαρη-Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
54248, Ελλάδα, Τηλ.: 2310 311377, Fax: 2310 334378

Περιεχόμενο: 1 λίτρο



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να φυλάσσεται μακριά από πρόβατα, κοτό, και ζωοτροφές. Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε τα αερίσματα. Αποσπώντας την ετικέτα με το δόσο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση καύσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση αερίσματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία επάνω σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον όρθιο και σε ανάπνοια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αντιδοτό: Συμπληρωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΤΗΡΙΑΣΙΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπάρους. Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Να αποφευχθεί η χρήση ολόκληρου του υλικού του αραβοσίτου ως ζωοτροφή πριν την ωρίμανσή του. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή ποτισμό νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντιστα με τη φορά του ανέμου. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.

Τρόπος καθαρισμού του ψεκαστικού:

Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

Αδειάστε τελείως το βυτίο. Εισαγάγετε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά. Εισαγάγετε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνιακού οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το βυτίο αυτό μέσω όλου του συστήματος « ψεκάζοντας » υπό συνεχή ανάδραση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανιέρω διαδικασία προσθέτοντας πάλι αμμωνία άλλη μια φορά, και μια ακόμη φορά χωρίς αμμωνία. Χρησιμοποιείτε το ίδιο βυτίο για το ξεπλύσιμο δύο φορές των φύτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (το νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρυπητή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας:

