

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καννίζετε. •Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματολογική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από Ήπια, ασθένειες ή έντομα ή έχουν ζημιωθεί ή καταπονθεί από προηγούμενες εφαρμογές φυτοφαρμάκων. •Σε μεταφυτευτικές εφαρμογές, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 21°C, υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Ψεκάστε αργά το απόγευμα. •**Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (ιεραρχικές καλλιέργειες και υδάντες επιφανείες):** Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού, να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού, οι οποίες απέχουν λιγότερο από **5 μέτρα** από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Ethofumesate

ΑΛΦΑ 50SC

Ethofumesate (Εθοφουμεζέιτ) 50%
Πυκνό εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Ethofumesate** 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 53,42% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 7590/31.03.2008
Ημ. Λήξης: 28.02.2013

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και ημιετήσιων ζιζανίων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΘΟΖΑΤ:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και ημιετήσιων ζιζανίων. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα. Παρεμποδίζει την βιοσύνθεση των λιπιδίων αξέων με δράση στις επιμηκυνάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιομορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με 20-30 λίτρα νερό/στρέμμα. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται μέσα σε 2 ώρες από την παρασκευή του. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). Χρησιμοποιείτε μηεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από τη χρήση του. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτί. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτί και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορροπantικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΕΥΤΙΛΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΙΛΑ: Ετήσια αγρωστώδη και ημιετήσια ζιζάνια. Καπνόχορτο, Καλλιπτόδια μεγαλόκαρπη, Στεφάνια, Τραχύ βλήτο, Σετάρια. Δόση: α) **150-200** για εφαρμογή **μεταφυτευτικά** στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας και μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1). β) **50** για εφαρμογή **μεταφυτευτικά** (μικροδόσεις ζιζανιοκτόνων)** από το στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Δύο (2). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-30 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

* Για διευκρίνιση του φάσματος και στα καταπορευόμενα από το **Record*** ζιζάνια, το **Ethofumesate ΑΛΦΑ 50SC** μπορεί να συνδυασθεί με 400-500 κ.εκ./στρ. **Record*** 8/8 EC.

** Σε μείγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα σε μειωμένες δόσεις και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Η μέγιστη ποσότητα **Ethofumesate ΑΛΦΑ 50SC** που επιτρέπεται να εφαρμοσθεί στο ίδιο χωράφι σε διάστημα 3 ετών είναι 200 κ.εκ./στρέμμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν εννέα μήνες μετά την εφαρμογή του **Ethofumesate ΑΛΦΑ 50SC** στο χωράφι. Όργωμα σε βάθος 15-20 εκ. πρέπει να γίνεται πριν τη σπορά ή τη φύτευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με το σκεύασμα **Record*** 8/8 EC (phenmedipham 8% + desmedipham 8%).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φθίδες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεραζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Μέλος του



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ