



The Chemical Company

Enervin® Top 12/44 WG

Ametoctradin/Metiram (αμετοκτραντίν/μετιράμ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Ametoctradin 12% β/β (ομάδα πυριμιδιλαμινών),
Metiram 44% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών),
Βοηθητικές ουσίες 35.4 % β/β.

**Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που
οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωμουκήτων
(περονόσποροι).**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60358/27-03-2013

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 κιλό

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΠΥΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος
συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως
άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος
συσκευασίας.

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο των περιεχομένων στην αποχέτευση. • Το υλικό και ο περιέκτης του, να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικινδύνω απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση στο στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας. • «Το σκεύασμα περιέχει Metiram. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε φυεαστικό υγρό. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Σπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευθείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη έντονη πίεση από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει ασπασμούς. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, το ametoctadim, μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση που ανήκει στη χημική ομάδα των πυριμιδιλαιών και το metiram μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση που ανήκει στη χημική ομάδα των διθειοκαρβαμικών, το οποίο αντιμετωπίζει το μύκητα κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκβλάστησης των σποριών που πριν εισχωρήσει στο φυτικό ιστό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκαρός κανονικού όγκου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΔΟΣΕΙΣ (σχευασμάτων)

ΑΜΠΕΛΕΣ (Εμπράτεις και Οινόπαινες): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) με δόση 250-625 γραμ./100 λίτρα φυεαστικού υγρού. Η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα πρέπει να είναι 250 κ.ε. **Όγκος φυεαστικού υγρού:** 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Συζητήστε η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΤΟΜΑΤΑ (Γεωμυρρινό, Θερμοκλήπυ),**

Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 200-1000 γραμ./100 λίτρα φυεαστικού υγρού. Η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα πρέπει να είναι 200 κ.ε. **Όγκος φυεαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα.

Συζητήστε η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΑΤΑΤΑ:** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 200 γραμ./στρέμμα. **Όγκος φυεαστικού υγρού:** 15-100 λίτρα/στρέμμα.

Συζητήστε η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 5-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υμαιοβύο):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 200 γραμ./στρέμμα. **Όγκος φυεαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα.

Συζητήστε η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΑΓΓΟΥΡΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υμαιοβύο, Θερμοκλήπυ),**

ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υμαιοβύο): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 200-1000 γραμ./100 λίτρα φυεαστικού υγρού. Η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα πρέπει να είναι 200 κ.ε. **Όγκος φυεαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα.

Συζητήστε η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, ταχείας ανάπτυξης της βλάστησης ή υψηλής πίεσης της ασθένειας, συζητήστε η τήρηση των μικρότερων προτεινόμενων διαστημάτων μεταξύ των εφαρμογών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων:

• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ή άλλα σκευάσματα που περιέχουν ametoctadim περισσότερες φορές από αυτές που ορίζονται ανά έτος για την κάθε καλλιέργεια και αγροεπίχρη. Στον μέγιστο αριθμό των εφαρμογών ανά έτος να υπολογίζετε και τις καλλιεργείες αμειψιοποράς.

• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ελώδεις περιοχές δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, υψηλό εδαφικό και χαμηλή περικτικότητα σε οργανική ύλη.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Η εισόδος να επιτρέπεται από στεγνώματα το φυεαστικό διάλυμα.



ΠΟΥΛ ΤΟΙΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ασφάλεια ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τα επηρεαζόμενα όδια, όταν εφαρμόζετε το σκεύασμα στην καλλιέργεια του αμπελιού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα. Σε περίπτωση χρήσης του σε νέες ποικιλίες συστάται να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές σε λίγα φυτά, πριν την εφαρμογή του στην καλλιέργεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΕΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του φυεασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ENERVIN TOP δεν συνδυάζεται με προϊόντα που περιέχουν chlorpirifos σε μορφή υδατοδιαλυτών γαλακτωμάτων (EC).

ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπελί: 35 ημέρες.

Πατάτα, Μαρούλι: 7 ημέρες.

Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΕΑΣΤΗΡΑ: --

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φυεαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριψύμια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Αναγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΗΚΕΥΣΗ:** Το σκεύασμα διατηρείται για δυο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαράβατη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.