

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το Equip δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις περισσότερες από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια. Να μην ψεκάζεται σε καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογή διασυστηματικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο. Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι ή καλαμπόκι σπαραγοπαραγωγής.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (Γετονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες): Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από υδάτινες επιφάνειες.

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γετονικές καλλιέργειες ή φυτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

Ποσότητες του σκευάσματος πρέπει να καίνονται σε εμπορικούς αποτρωγνείς, Άδειες συσκευασίες του σκευάσματος, πρέπει να πλένονται πάρα πολύ καλά με άφθονο νερό. Τα νερά του ξεπλύματος συνιστάται να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Κατόπιν τούτου οι άδειες συσκευασίες, αποσύρονται είτε με καύση σε αποτρωγνή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους. (π.χ. με τρύπημα).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του παραβίαση συσκευασία μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε θερμοκρασίες δωματίου.

Ημερ. Παρασκευής—Ημ. Λήξης—Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και τον ψεκασμό. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικινδύνους απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση παρατεταμένης εξοπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον ήρεμο. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί. Πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμεινεί, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για το γιατρό: Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα. Αρχική θεραπεία συμπτωματική και υποστηρικτική. Εάν καταποθεί φροντίστε να προλάβετε πιθανή εισρόφηση του γαστρικού υγρού σε περίπτωση εμετού.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



5200309 800041



Equip

OD (Ελαιώδες εναώρημα)

foramsulfuron (φοραμσουλφουρόν) 2,25%
χημική ομάδα: σουλφονουλουργίες

1 Λίτρο €

Αρ.Εγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας
7734/30.6.2013

Διασυστηματικό Ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Ερεθίζει το δέρμα
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

Κάτοχος της έγκρισης:
Bayer Ελλάς ABEE

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση
Bayer Ελλάς ABEE

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκίν OD

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουλουργιών που είναι γνωστές για τη ζιζανιοκτόνο δράση τους μέσω παρεμπόδισης του ενζύμου, οξειδωλακτικής συνθεάσης (ALS), για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανόιντα όσο και με τον καπνίοντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό ενώ η πλήρης νέκρωση του επέρχεται σε διάστημα 2-4 εβδομάδων.

Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρές από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10° C), υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30° C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και ελλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Η δράση του προϊόντος δεν θα επηρεασθεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας. Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο καλαμπόκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό. Ανακινήστε πολύ καλά τη φιάλη και προσθέστε το περιεχόμενο στο δοχείο του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως τη φιάλη και ξεπλύνετε τη καλά με νερό, το οποίο θα προσθέσετε στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Μην προετοιμάζετε περισσότερο ψεκαστικό υγρό απ' όσο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε άλλες καλλιέργειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό, αποσυρμαολογήστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 10% της χωρητικότητας του με νερό και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Εφαρμόστε το νερό αυτό στην ψεκασμένη περιοχή. Επαναλάβετε τη διαδικασία ξεπλένοντας καλά. Ελέγξτε ξανά τα ακροφύσια και τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε τα καλά εάν είναι απαραίτητο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Ο ψεκασμός γίνεται με ακροφύσια τύπου σκούπας και πίεση 2,5-3atm.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΥΟΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Αγρωστώδη: Sorghum halepense (Βέλυρας), Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα), Setaria spp. (Σετάριες), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Poa annua (Κοινή πόα). Πλατύφυλλα: Amaranthus retroflexus, (Τραχύ βλήτο), Amaranthus blitoides (Πλαγαστό βλήτο), Solanum nigrum (Αγριοτοματά), Xanthium strumarium (Αγριομελίτζινα), Chenopodium album (Λουβουδιά), Abutilon Theophrasti (Αγριοβαμβάκι), Portulaca oleracea (Αντράκια), Datura stramonium (Τάτολας), Urtica urens (Μικρή τσουκνίδα).

Δόση: α) Μία εφαρμογή: 200-267 κ.εκ./στρέμμα. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων με 30 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

β) Δύο εφαρμογές: 130 κ.εκ./στρέμμα. Η πρώτη συνιστάται να γίνει όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων και η δεύτερη 2 εβδομάδες αργότερα με 30 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

Τα ζιζάνια θα πρέπει να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης και ιδιαίτερα το Αιματόχορτο, Αγριομελίτζινα, Λουβουδιά και Αγριοβαμβάκι να μην έχουν ξεπεράσει το στάδιο των 4 φύλλων.

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξαναεφαρμόσει αραβόσιτος, αφού προηγηθεί άρσης. Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρύνει χειμερινά σιτηρά (σπάρη, κριθάρι) και την επόμενη άνοιξη ζαχαρούλετλα, βαμβάκι, ηλιανθός ή σόγια.

Διανομέας:

Bayer Ελλάς ABEE

Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 6166000

Fax: 210 6109100



Bayer CropScience