

Finy®

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, και Τριτικάλε.

Metsulfuron-methyl

(μετσουλφουρόν-μεθυλ) 20 %
(χημ.ομάδα σουλφονουριών)



 **AgriChem** bv
The Netherlands

Κάτοχος της έγκρισης:
Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9,
4906 CV Oosterhout, The Netherlands

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ &
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε απέκαστη μια ζώνη προστασίας 5 μ. από τα επιφανειακά ύδατα.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ρυπάνθηκαν ή βράχθηκαν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ: 7966/28-12-2011

Εγγυημένη σύνθεση: Metsulfuron-methyl 20 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 79,17% β/β

Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με μεγάλο βαθμό έκπλυσης. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή προσβολές εντόμων, κ.λπ.

Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή ζιζανιοκτόνου της ίδιας ομάδας (σουλφονουριές) ή ζιζανιοκτόνου ίδιου τρόπου δράσης, κατά την ίδια καλ/κή περίοδο.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 60 Γραμμάρια



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά-Διανομέας:
ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Τριτικάλε:

καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια (1) με δόση 2-3 γρ/ στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30-40. Εφαρμογή νωρίς την άνοιξη από την αρχή του φυτρώματος (BBCH 12) μέχρι το σχηματισμό του 2ου γόνατου (BBCH 32) και όταν τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά και βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης

Παρατηρήσεις:

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Stellaria media (στελλάρια), *Veronica persica*. (βερόνικα), *Paraver rhoeas* (παπαρούνα), *Capsella bursa-pastoris* (καφέλλα), *Viola tricolore* (αγριοπανσές), *Matricharia chamomilla* (Χαμομήλι), *Cirsium arvensis* (Κίρσιο), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Rumex* spp. (λάπαθο) , *Lamium purpureum* (πορφυρό λάμιο), *Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι), *Polygonum convolvulus* (Πολύγωνο)

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ όλη την διάρκεια του ψεκασμού

Καθαρισμός ψεκαστήρα: για να αποφευχθούν ζημιές σε επόμενες καλλιέργειες διαφορετικές από τα σιτηρά, αμέσως μετά το ψεκασμό του FINY, ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχάνημα, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στα ακροφύσια και στα φίλτρα, με κατάλληλο καθαριστικό διάλυμα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αμέσως μετά το ψεκασμό, αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε σχολαστικά το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό.
2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό μέρος του βυτίου με καθαρό νερό και κυκλοφορήστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του βυτίου. Αδειάστε τελείως το βυτίο.
3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1/3 λίτρου οικιακής αμμωνίας για κάθε 100 λίτρα νερού (τελική επιθυμητή συγκέντρωση 0.03%). Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το για 15 λεπτά

με συνεχή ανάδευση. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει ξανά σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα και στην συνέχεια αδειάστε τελείως το βυτίο.

4. Αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά με διάλυμα οικιακής αμμωνίας στην ίδια συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε για το καθαρισμό του ψεκαστικού μηχανήματος.
5. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό με τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του και αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα . Αδειάστε τελείως το βυτίο.
6. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε εδάφη στα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν ευαίσθητες καλλιέργειες.

Τρόπος δράσης: Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν δεν αναμιγνύεται με προϊόντα που περιέχουν δ.ο. tralkoxidim και με λιπάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου.
2. Κατά τον ψεκασμό δίνετε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μη μεταφέρεται το ψεκαστικό υγρό σε γειτονικές ή ευαίσθητες καλλιέργειες (ιδίως πλατύφυλλες).
3. Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς.
- 4 . Κατά την εφαρμογή, μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
5. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
6. Πριν και μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό. Εάν είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για την εφαρμογή του προϊόντος.
7. Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με μεγάλο βαθμό έκπλυσης.
8. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή προσβολές εντόμων, κ.λπ.
9. Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή ζιζανιοκτόνου της ίδιας ομάδας (σουλφονουλουρίες) ή ζιζανιοκτόνου ίδιου τρόπου δράσης, κατά την ίδια καλ/κή περίοδο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας, εντός 3 μηνών μετά την εφαρμογή του προϊόντος, μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός σιταριού ή κριθαριού και μετά από βαθιά άροση. Σε αυτή την περίπτωση μην κάνετε δεύτερη εφαρμογή του Finy. Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, ξηρά φασόλια ή γρασίδι μετά από καλλιέργεια σιτηρών στην οποία εφαρμόστηκε το Finy.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μετά την εφαρμογή, περιμένετε 24 ώρες για να εισέλθετε στο χωράφι

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: -

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Δεν εφαρμόζεται

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης, Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.