



Flow[®] 50 SC

5 Λίτρα e

Άρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7906/29-12-2008

Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluometuron 50 β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 55,23% β/β

Ζιζανιοκτόνο

Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
Εργοστάσιο Παρασκευής - Συσκευασίας:
Nufarm GmbH & Co KG Austria



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΦΛΟΥΥ 50 SC

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Προφυτρωτικό - μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ομοιόμορφος ψεκασμός αμέσως μετά τη σπορά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακόφυτων, όταν έχουν ύψος 10-15εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση, με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά το φάρμακο, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βαμβάκι:

α. Καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών. Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά. **Δόση:** 250-500κ.εκ./στρέμμα.

β. Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15εκ. **Δόση:** 200κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-60 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφρά εδάφη.

2. Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του να ακολουθεί βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρέμμα.

3. Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400κ.εκ. ανά στρέμμα, τότε δεν πρέπει να φυτεύονται μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα, μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει 1 χρόνος.

4. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*), Σετάριας (*Setaria spp.*), Ήρες (*Lolium spp.*)

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βλήτο (*Amaranthus spp.*), Χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), Λουβουδιές (*Chenopodium spp.*), Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Gallium aparine*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Λάπαθο (*Rumex spp.*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*)

Ανθεκτικά ζιζάνια (τα πιο σημαντικά): Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Αγριοβίβλος (*Hibiscus trionum*), Μολόχα (*Malva spp.*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τις συσκευασίες που θα καταστραφούν προηγουμένως, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές θερμοκρασίες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον μακριά από απ' ευθείας έκθεση στο φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επκέτα. • Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης: Αν καταποθεί κάνετε πλύση στομάχου. Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επκέτα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γεγονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από τρεις (3) ατμόσφαιρες (45 PSI). • Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορροπαντικό.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες




GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
Παπαδά 2 & Μεσογείων,
115 25, Αθήνα
Τηλ: 210 6990932



Bayer CropScience

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



5200309 898000

N 12 2865 09