

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να φοράτε κατάλληλης μπότσε κατά την διάρκεια της εφαρμογής • Μην εισπνεύετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλης μπότσε εφόσον εισπνεύουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα • Αποφύγετε την ελεύθερωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήτο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **Γενικά:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλή αεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασεως καλέστε αμέσως γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμπλεκόμενα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγείτε σταδίσματα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό antidote. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμοι καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ρυθμίστε το δοχείο ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα:

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση. Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος δράσης: Το metalaxyl-m σε βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την σύνθεση του r-RNA, είναι εκλεκτικό δισυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποηλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς. Το chlorothalonil σε βιοχημικό επίπεδο αναστέλλει τη δράση διάφορων ενζύμων και άλλων μεταβολικών διεργασιών, είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση των σπορίων των ευαισθητών μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών.

L143279 GREC/2N PPE 306655



FolioGold® 3,6/50 SC

syngenta®

Metaxyl-m (μεταλαξυλ-Μ)
(ομόδο φαίνυλαμιδίων)
Chlorothalonil (χλωροθαλονίλ)
(ομόδο χλωρονιτριλίων)

Αρ. Ορισ. Έγκρ. Κυβ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60266 / 11-2-2010
Ημ. λήξης Έγκρισης Κυβ.: 28-2-2016

Πυκνό εναιώρημα (SC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Metaxyl-m: 3,63% β/ο +
Chlorothalonil: 50% β/ο +
Βοηθητικές ουσίες: 56,53% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
153 49 Ανδρούσα, Τηλ.: 210 666612-13
ΘΕΣ ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σινός, Τηλ.: 231 0796940-3
www.syngenta.gr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Agro S.A., Γαλλία

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
- Υποπο καρκινογόνες
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Φάσμα δράσης:

Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για περονόσπορο με 200-250 κ.εκ.ακ/στρ (200-250 κ.εκ.ακ/100ℓτ ψεκ.υγρού). Με όγκο ψεκ.υγρού 80-100 ℓτ/στρ .Ψεκάσμοι φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Κρεμμύδι (υλωρό και ξερό): Για περονόσπορο με 200 κ.εκ. ακ./στρ και όγκο ψεκ.υγρού 60-80 ℓτ /στρ. Ψεκάσμοι φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πατάτα: Για περονόσπορο με 200-250 κ.εκ.ακ./στρ με όγκο ψεκ.υγρού 80-100 ℓτ/στρ Ψεκάσμοι φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.)
- Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC σε προγράμματα ψεκάσμων σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
- Μείνιτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πεπόνι (θερμοκηπίου και υπαίθρου), κρεμμύδι (υλωρό και ξερό), πατάτα: 14 ημέρες.



Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη

