

Folpet

Makhteshim

80WG

Folpet (Φοήπét) 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

ΦΟΛΠΕΤ 80%:
Μικητοκτόνο φυλλώματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Με ψεκασμούς καλύψως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου στο δοχείο με συνεχή ανάδευση. Προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα & επιτραπέζια σταφύλια): Φόμωψη. 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές: α) Έκπτυξη ματιών, β) Αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, γ) Στάδιο 2-3 φύλλων. Περονόσπορος. Εφαρμογές: α) Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ., β) Μετά από 10 ημέρες, γ) Λίγο πριν την άνθηση, δ) Λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Τεφρά σήψη. Για οινοποιήσιμα σταφύλια, εφαρμογές: α) Τέλος άνθησης, β) Αρχή καρπόδεσης, γ) Πριν από το κλείσιμο των σταφυλιών, δ) Αρχή ωρίμανσης. Για επιτραπέζια σταφύλια, εφαρμογή στο τέλος άνθησης. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ:** Περονόσπορος, Αλτερναρίωση. Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Περονόσπορος, Αλτερναρίωση. Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. **ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Περονόσπορος, Ανθράκνωση. Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Αλτερναρίωση. Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. **ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ:** Αλτερναρίωση. Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού/στρ.:** Αμπέλι (50-150), Κρεμμύδι (40-50), Τομάτα υπαίθρου-Πεπόνι υπαίθρου-Καρπούζι υπαίθρου-Πατάτα-Γαρυφαλιά (50-100).
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΗ: 125- 150 γρ./100 λίτρα νερό.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
Αμπέλι (4), Κρεμμύδι-Τομάτα υπαίθρου-Πεπόνι υπαίθρου-Καρπούζι υπαίθρου-Πατάτα-Γαρυφαλιά (3).

Παρατηρήσεις:
1) Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτινίωσης και Κλαδοσπορίωσης της τομάτας και του πεπονιού. 2) Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

Folpet

Makhteshim

80WG

Folpet (Φοήπét) 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι (για οινοποιήσιμα σταφύλια): **42 ημέρες.**
Αμπέλι (για επιτραπέζια σταφύλια): **στο τέλος της άνθησης.**
Κρεμμύδι-Πεπόνι υπαίθρου-Καρπούζι υπαίθρου-Πατάτα: **21 ημέρες.**
Τομάτα υπαίθρου: **στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.**

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, εκτός από τα πολύ αλκαλικά υλικά και τα ελαιώδη σκευάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακκούλες και τα σακκίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του (κλειστή) συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και σκοτεινό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Folpet

Makhteshim

80WG

Folpet (Φοήπét) 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Folpet** 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 14,89% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλoφ.: 6613/4.5.95/01
Ημερ. Λήξης: 30.09.2017

Μυκητοκτόνο φυλλώματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται **μόνον για επαγγελματίες χρήστες.**
Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. •Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. •Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες. •Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με Folpet επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Ν'ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 750 γρ.