

FOSALUM 80WP

Fosetyl-Al (Φωσετύλ-Αλ) 80% β/β

Εγγ.σύνθεση: Fosetyl-Al 80%β/β, βοηθ.ουσίες: 16,67%β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Αριθμ. Εγκρ. Κυκλ.: 6990/02.02.2005

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -ΔΟΣΕΙΣ (γρ/100 λίτρα νερού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΚΟΝΟΦΟΡΑ: Προσβολή από *Phytophthora cactorum*. 250. Ψεκασμός μια φορά το μήνα στην διάρκεια της ανάπτυξης (συνολικά 2 ψεκασμοί). **ΚΑΛΑΔΙΣΤΙΚΑ:** Φυτόφθορα.400 γρ/κυβ. μέτρο χώματος. Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. 10 γρ/τετρ.μέτρο. Ριζοπάθεια αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. Επανάληψη μια φορά το μήνα (μέχρι 4 εφαρμογές). **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ (Γκρεπ-φρούτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά):** Φυτόφθορα 250-300, ένας ψεκασμός τον μήνα αρχίζοντας την περίοδο της ενεργούς βλάστησης όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένας ψεκασμός στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Συνολικά εφαρμόζουμε 3-4 ψεκασμούς το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη). Για την φυτόφθορα των καρπών ψεκάσουμε το φύλλωμα μια φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει το χρώμα (1-2 ψεκασμοί). **ΜΗΛΙΑ:** Φυτόφθορα λαμού και ριζών. 250, 3-4 εφαρμογές στην περίοδο της ενεργούς βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού). **ΑΜΠΕΛΙ:** Περονόσπορος. 250-300, 4 ψεκασμοί όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΦΡΑΟΥΛΑ:** Σήψεις λαμού. 200-250, εμφάνιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση. 400, ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση (εως 2 επεμβάσεις). **ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ:** Περονόσπορος. 300γρ/στρ. Μέχρι 4 ψεκασμούς που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται δυο φορές το μήνα. **ΤΟΜΑΤΑ:** Περονόσπορος. 200-300 (υπαίθρου). Εως 4 ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται δυο φορές το μήνα. 300-400 (θερμοκήπιο), με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας ψεκασμοί ανά 8-10 ημέρες (μέχρι 4 επεμβάσεις). **ΑΓΓΟΥΡΙΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ:** Περονόσπορος. 200-300, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δυο ψεκασμοί το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προβολής συνιστάται ο ψεκασμός ανά 10ήμερο με τη μεγαλύτερη δόση (μέχρι 4 εφαρμογές). **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΛΑΧΑΝΟ, ΜΑΡΟΥΛΙ:** Περονόσπορος. 60 γρ/τετρ.μέτρο. 2 ριζοπτώσιμα: ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση. **ΠΡΑΣΑ:** Περονόσπορος. 300 γρ/στρ. 4 ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται δυο φορές το μήνα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος. 250-300, 4 ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ και επαναλαμβάνονται δυο φορές το μήνα. **ΛΥΚΙΣΚΟΣ:** Περονόσπορος. 250-300, ψεκασμοί: 1^{ος} όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ και 2^{ος} όταν φτάσει 20-30 εκ. **ΚΑΠΝΟΣ:** Περονόσπορος. 250-300. Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μια βδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 μέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής (μέχρι 4 εφαρμογές).

Παρατηρήσεις:1.Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, πατάτα και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προεidoποίησεων.2.Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή: 200-400, Μηλιά:100-200, Αμπέλι:50-150, Φράουλα:50-70, Κρεμμύδι:40-50, Τομάτα υπαίθρου, πεπόνι,καρπούζι, κολοκύθες, πατάτα, καπνός:50-100, Τομάτα, αγγούρι και κολοκύθι θερμοκηπίου:50-200, Αγγούρι, κολοκύθι υπαίθρου, πράσα:50-80, Λυκίσκος, κωνοφόρα:300-500.

Φυτοτοξικότητα: Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις, χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό, dicofol, με ελαιώδη σκευάσματα και με σκευάσματα θείου υγρής μορφής. Επίσης δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος, εμφάνιση ριζώματος, ριζοπάθεια, ενσωμάτωση σε τεχνητά υποστρώματα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι, μαρούλι, λάχανο, φράουλα: 14 ημέρες,

Αγγούρι: 1 ημέρα,

Λοιπές καλλιέργειες:3 ημέρες

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Χρησιμοποιείστε συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.

“ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. ”

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα και προκαλέστε εμετό (με το δάκτυλο ή εμετικό) μόνον αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε σύγχυση. Εάν πέσει στα μάτια ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό. Για να είναι σίγουρο ότι θα ξεπλυθούν καλά κρατείστε τα ματόκλαδα μακριά από τους βολβούς των ματιών. Αν προκληθεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. Αν πέσει στο δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:Τα κενά μέσα συσκευασίας (σκούλες, σάκoi) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΧΙ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Περιεχόμενο:
400γρ.

Ερεθίζει τα μάτια.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σπινός, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380 22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

05/10