

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αντανέετε εκκενώματα. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα μεσώμας με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά προστατευτικά μαντί, προσποπούς. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Σε περίπτωση κατάστασης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. • Το υλικό αυτό και ο περιεχόμενός του να απορριπτόνται σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανακύκλωση/ανακύκλωση.

Για τη αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο** • Σε περίπτωση κατάστασης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Αντίδοτο:** Πενικιλλίνη

Τηλεφωνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΙΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ. ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΟΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ /ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩ ΦΥΚΑΣΤΙΚΩ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείτε το σκεύασμα καλά, προσέξτε ότι η συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώνετε το ψεκαστικό δοχείο με νερό συνεχώς(ότις την αναδέυση).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στη ροδόκνικα και νεκταρινιά μετά την έκπτυξη των φυλλών. Εφαρμογή στις κτηνικές πεοκίες της μηλιάς μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Στη μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή είναι μήκους 1 εκ. Γενικά να αποφευχθεί η χρήση του κατά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Όλοι οι συνδυασμοί θα πρέπει να δοκιμάζονται σε μικρή έκταση πριν την εφαρμογή τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνοκαρπία: Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι (για επιτραπέζια και ονοποποιητικά σταφύλια): 21 ημέρες. Ελιά: 21 ημέρες. Λαχανικά (Y+Θ): 7 ημέρες. Γομάτα: Υπαίθριο: 10 ημέρες. Βερκοκίτρινος: 7 ημέρες. Πατάτα, Αραχίδα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (Αίρα/σπρέυ/μπα): Εσπεριδοειδή: 200-250, Αμυγδαλιά: 100-150, Καρυδιά: 100-150, Μήλα, Αχλαδιά: 100-200, Βερκοκίτρινος: 100-120, Κεράσι: 100-120, Ροδόκνικα, Νεκταρινιά: 100-120, Αμπέλι: 50-150, Ελιά: 150-300, Τομάτα, Πεπόνια (Y+Θ): 50-100, Κολοκυνθοειδή: 50-100, Φασόλι: 50-80, Σελινό: 50-80, Καρότο: 50, Αραχίδα: 60, Πατάτα: 50-100, Ζαχαρότευτλα: 40.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Εσπεριδοειδή: 3, Αμυγδαλιά: 3, Καρυδιά: 4, Μήλα/Αχλαδιά: 3, Βερκοκίτρινος: 3, Κεράσι: 4, Ροδόκνικα, Νεκταρινιά: 4, Αμπέλι: 4, Ελιά: 2, Τομάτα/Πεπόνια: 4, Κολοκυνθοειδή: 4, Καρότο: 4, Φασόλι: 3, Σελινό: 3, Αραχίδα: 3, Πατάτα: 4, Ζαχαρότευτλα: 4.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα σκευασμούς (φιάλες, δοχεία) ελεγχονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή έκλυση (τα νερά του εξέλκωματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριτογενή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ήλιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



Φουνγκουράν

Funguran®-OH

Υδροξείδιο Χαλκού

Μυκητοκτόνο

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγγυημένη σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός: 30% β/ο σε μορφή (φθινόπωρο), 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Αμπέλι:** Για επιτραπέζια και ονοποποιητικά σταφύλια. Περονόσπορος, Ανθράκωση, Βακτηριακή νεκρώση. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες. Λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. **Δόση:** 150-175 κ.εκ./στρ. (100-350 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

Ελιά: **Κυκλοκόνιο:** Στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές ανοίξης. **Δόση:** 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο), 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (άνοιξη).

Γομάτα: **Κυκλοκόνιο:** Στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές ανοίξης. **Δόση:** 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο), 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (άνοιξη).

Λαχανικά **Τομάτα - Πεπόνια (Y+Θ):** Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη από 10-14 ημέρες. Κλαδοσπορίωση, Ζεττορία, Ανθράκωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη από 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Βακτηριώδης. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρποδότηση. **Δόση:** 175-250 κ.εκ./στρ. (175-415 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) (βαρέα προσβολή), 100-150 κ.εκ./στρ. (150-265 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) (ελαφρά προσβολή).

ΚΑΡΟΤΟΚΥΤΩΣΗ (αγγούρι, κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι): Περονόσπορος, Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Βακτηριώδης. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη από 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 100-150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑ: Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Βακτηριώδης. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 100-150 κ.εκ./στρ. (200-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΣΕΛΙΝΟ: Ζεττορία, Κλαδοσπορίωση. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 100-150 κ.εκ./στρ. (125-230 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος, Ανθράκωση. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη από 7-14 ημέρες. Βακτηριώδης. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη από 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 100-150 κ.εκ./στρ. (125-230 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΑΡΑΧΙΔΑ: Κλαδοσπορίωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη από 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 150 κ.εκ./στρ. (250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καρπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις για τα σπορματικά υγρά εμφανιστεί, το ευρύς των δόσεων είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Στα λαχανικά να αποφευχθούν οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές περιόδους. Στις εφαρμογές μετά καρπώσεως και γάλακτος, εσσοίς οι καρπικές συνθήκες ενοχλούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες αμύγδαλης, εσπεριδοειδών, πυρηνοκαρπία, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό καλλιέργεια ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος. Ποσότητα σκευάσματος (κ.εκ. σκευάσματος/στρ.): Εσπεριδοειδή: 310, Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά: 335, Καρυδιά: 150-335, Μήλο: 150-650, Πυρηνοκαρπία: Βερκοκίτρινος: 175-270, Κεράσι: 175-300, Ροδόκνικα, Νεκταρινιά: 150-330, Αμπέλι: 150-175, Ελιά: 485-975 (φθν.), 450 (άνοιξη), Καρότο: 100-150, Τομάτα-Πεπόνια (Y+Θ): 175-250 (βαρέα προσβολή), 100-150 (ελαφρά προσβολή), Φασόλι: 100-150, Σελινό: 100-150, Αραχίδα: 150, Πατάτα: 175-250 (βαρέα προσβολή), 100-150 (ελαφρά προσβολή), Ζαχαρότευτλα: 150.

Κάτοχος Έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής:

SPIESSURANIA

Spiess-Urania Chemicals GmbH Γερμανία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Απεκτείνουσας αντιπρόσωπος - Διανομείς:

YPSILON Α.Ε.
Δ. Γλυφού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49,
Τηλ. 2310311377, Fax: 2310334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

YPSILON®

Περιεχόμενο 350ml