

linke Seitenfalte 100

Beutelvorderseite 190

rechte Seitenfalte 100

Beuteloberkante

Beutelrückseite 188

2 mm Beschnitt

6 mm Druckbildergdnzung von der Rckseite

Φουνγκουράν Funguran® OH 50 WP

Υδροξειδίο του Χαλκού

Μυκητοκτόνο

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Μυκητοκτόνο - Βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Εγγραμμένη σύνθεση: Υδροξειδίο του χαλκού περιεκτικότητας σε μεταλλικό χαλκό: 50% β/β Βοηθητικές ουσίες: 17.98% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6861 / 25-6-2002

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμολογικών βλαβών

Παρασκευαστής - Τυποποιητής - Συσκευαστής:

SPIESS © URANIA

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος - Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 2,0 ΚΙΛΑ

50 WP

Funguran® OH

Funguran® OH

Μυκητοκτόνο - Βακτηριοκτόνο

Φουνγκουράν Funguran® OH 50 WP

ΚΑΜΙΕΡΤΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΤΕΡΙΑΣΙΔΗ (Ποτακτολίδη, Λεμονία, Μιστράκη, Γράσι φρούτι), Κορυμόθρα, Ανθράκωση, Σπασμοκίση, Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Προσβολή κλάδων, φύλλων και καρπών (Pseudomonas syringae). Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόση: 60-90gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Κορυμώ, Σίς περαχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζετε το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν την έκπτυξη των βλαστών ορθώνων. ΕΞΕΛΙΚΤΗ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ: Εάν υπάρχουν ενδοκεί για το βακτηριοκτόνο, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής στην αρχή της ανθής. Δόση: 130-155gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. ΚΑΡΥΔΑ: Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών. 110-160 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν σταματήσουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. ΜΗΛΟΒΑΝΑ (Μήλα, Αχλάδι): Φουξιάδα, Σπασμοκίση, Φυά σήψη. 110-240 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πρώτης καρμής. ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΙΣΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΟ ΚΑΪΜΑ, 110-250 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Σίς περαχές που ενδημούν οι ασθένειες απαιτούνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δόκιμηση των οσθώνων. Φυά σήψη. Κατά τη δόκιμηση των οσθώνων και στη ροή της καρμής. Δόση: 130 -165 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. ΚΕΡΑΣΙΑ: Κορυμώ, Προσβολή από Pseudomonas syringae. 130 -170 gr./100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογή στις περαχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόζετε στο φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δόκιμηση των οσθώνων. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Κορυμώ, Εξοσκή, Κλαδοσποριοκίση. Εφαρμογή στις περαχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόζετε α) το φθινόπωρο μόλις πεσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη δόκιμηση των οσθώνων. Φυά σήψη. Εφαρμογή κατά τη δόκιμηση των οσθώνων και στην ροή της καρμής. ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΟ ΕΛΘΟΣ, Εφαρμογή: Σίς περαχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζετε στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση: 110 -170 gr./100 λίτρα φεκ. υγρ. ΑΜΠΕΛΙ (επιπρόσθετα και ονοσπορίδιο σπυρίλλο): Περονόσπορος, Ανθράκωση, Βακτηριακή νεκρωσία, 85-215 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ, μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την ανθής και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. ΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΑΚΙΑ, 110-240 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (το φθινόπωρο), 110-210 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (την άνοιξη). Σίς περαχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμόζετε στο αρχικό στάδιο μέχρι αρχές άνοιξης. ΠΑΝΟΡΑΧΙΑ, 240 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Δύο εφαρμογές. Η πρώτη όταν αρχίσουν να αρμυρώνει οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ, 110-240 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (το φθινόπωρο), 110-210 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (την άνοιξη). Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ): Περονόσπορος, 110-250 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για βαριά προσβολή), 110-160gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για ελαφρά προσβολή). Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροστών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Κλαδοσποριοκίση, Σπασμοκίση, Ανθράκωση, 110-250 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για βαριά προσβολή), 110-160 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για ελαφρά προσβολή). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Βακτηριακή, 110-250 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (βαριά προσβολή), 110-160 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για ελαφρά προσβολή). Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροστών μέχρι την καρμώση. ΚΑΛΟΚΥΝΩΣΙΔΗ (αγγούρι, κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι) (Υ+Θ): Περονόσπορος, Ανθράκωση, Κλαδοσποριοκίση, Βακτηριακή, 110 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Κερατοσποριοκίση, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. Βακτηριακή, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 135-140 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. ΣΕΛΙΝΟ: Σπασμοκίση, Κερατοσποριοκίση, 135-140 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΑΡΑΧΙΔΑ: Κερατοσποριοκίση, 190 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος, Ανθράκωση, 110-180 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για βαριά προσβολή), 110 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. (για ελαφρά προσβολή). Εφαρμογές όταν το φυτό έχει ύψος 15-20 εκ και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΥΤΗΛΑ: Κερατοσποριοκίση, 270 gr/100 λίτρα φεκ. υγρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή: 3, Αμυγδαλιά: 3, Καρύδια: 4, Μήλα/Αχλάδι: 3, Βερίκοκο: 4, Κεράσια: 4, Ρόδια, Νεκταρίνια: 4, Αμπέλι: 4, Ελις: 2, Τομάτα/Πιπέρι: 4, Κολοκυθάκια: 4, Φασόλι: 3, Σέλινο: 3, Αραχίδα: 3, Πατάτα: 4, Ζαχαροτεύλα: 4. Όγκος ψεκαστικού υγρού (Αεροσπρέιμα): Εσπεριδοειδή: 200-250, Αμυγδαλιά: 100-150, Καρύδια: 100-150, Μήλα, Αχλάδι: 100-200, Βερίκοκο: 100-120, Κεράσια: 100-120, Ρόδια, Νεκταρίνια: 100-120, Αμπέλι: 50-150, Ελις: 150-300, Τομάτα, Πιπέρι (Υ+Θ): 50-100, Κολοκυθάκια: 50-100, Φασόλι: 50-80, Σέλινο: 50-80, Αραχίδα: 60, Πατάτα: 50-100, Ζαχαροτεύλα: 40. Μέγιστη ποσότητα σκευασματος: Εσπεριδοειδή: 225 gr/στρέμμα, Αμυγδαλιά: 232,5 gr/στρέμμα, Καρύδια: 240 gr/στρέμμα, Μήλα, Αχλάδι: Φουξιάδα: 480 gr/στρέμμα, Βακτηριακή-Βακτηριοκίση: 500 gr/στρέμμα, Βερίκοκο: 198 gr/στρέμμα, Κεράσια: 204 gr/στρέμμα, Ρόδια, Νεκταρίνια: 204 gr/στρέμμα, Αμπέλι: 322,5 gr/στρέμμα, Ελις: 720gr/στρέμμα, Τομάτα, Πιπέρι (Υ+Θ): 250 gr/στρέμμα, Κολοκυθάκια: 110 gr/στρέμμα, Φασόλι: 110gr/στρέμμα, Σέλινο: 110 gr/στρέμμα, Αραχίδα: 110 gr/στρέμμα, Πατάτα: 190 gr/στρέμμα, Ζαχαροτεύλα: 110gr/στρέμμα. Παρατηρήσεις: • Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πληρούνται προς την άνοιξη, ιδιαίτερα για τα μήλοα και οι μεγάλες όταν οι καρποί συνήθως είναι ενδοκεί για την ανάπτυξη των ασθενειών. Σίς περατώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί το εαρινό της δόσης είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής. • Στη Λαγκαδιά να αποφευχθούν οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. • Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνεται εφόσον οι καρποί συνήθως ενδοκεί στην ανάπτυξη των ασθενειών. • Σίς καλλιεργήσεις αμπέλι, εσπεριδοειδή, μήλοα, πεπόνια, πεπόνια, ελις και λαγκαδιά από κούμψη να ακολουθούνται στις περαχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των νεοαγώνων προαποδοσπασμών. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΣΗ: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Αμυγδαλιά (Αμυγδαλιά, Καρύδια): 28 ημέρες, Μήλοα/Αχλάδι: Μη Εφαρμογή (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιεργείας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι (για επιπρόσθετα και ονοσπορίδιο σπυρίλλο): 21 ημέρες. Ελις: 21 ημέρες, Λαγκαδιά (Υ+Θ): 7 ημέρες, Τομάτα, Υπάρχο: 10 ημέρες, Βακτηριακή: 7 ημέρες, Πατάτα, Αραχίδα, Ζαχαροτεύλα: 21 ημέρες. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ: Είναι σημαντικό στις πρώτες ημέρες του ΔΕΛΤΑΡΕ, ROSETTE, MAGARA και CONDORO. Είναι σημαντικό στα περικόσπασμα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επιδιορθώσεις: εφαρμόζετε στο μήλοα μπορεί να προκαλέσουν κακό χρωματισμό. Στη μήλοα οι εφαρμογές να σταματήσουν όταν η πρώτης καρμής αποκολληθεί 1 εκ. Γενικά να αποφευχθεί η χρήση του κατά την άνοιξη. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (<5 C) και σε υγρές συνθήκες. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με οξικά σκευασματα, όξινα σκευασματα και με σκευασματα που περιέχουν θειάφι. Σίς περατώσεις συνδυασμού που με προσοχή, λάδι, εντομοκίση και άλλα μυκητοκίση διαλύεται το FUNGURAN-OH 50WP σε ένα δοχείο και μπορεί πρώτο στο βύτιο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευασματα. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Δοκιμάστε τη συσκευασία δόση του σκευασματος σε μικρή ποσότητα νερού, προσθέστε το στο ψεκαστικό και συμπιέστε με το υπόλοιπο νερό αναδενόμενος. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί κούμψες. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φασόλιες, σάκι) μαζί με τα κομμάτια τους καταπορούν προληπτικώς με σκόνη για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποσπώντας όλα σε σημεία αλλαγής, για αποκατάσταση ή ανάκτηση ενέργειας. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται το κλειστό στην αρχή του συσκευασίας σε μέρος ήπια, άρροαρο (θερμοκρασία κάτω από 35 C) και καλά αερίζωμο. Σίς συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

50 WP

Funguran® OH

Funguran® OH

Μυκητοκτόνο - Βακτηριοκτόνο

Papierbahnkante


druckfreie Zone, nur Kontroll-Marken erlaubt

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:
• Μακριά από τρώφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πινετε, μην καπνίζετε. • Μην αναπνεύετε την σκόνη. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό και προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου. Ο εμετός προκαλείται με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αχρησμένο αντικείμενο ή με σπογγί ψεκαστικού. Δεν προκαλείται εμετός και δεν γίνεται πλύση εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του. Μετά τον εμετό ή την πλύση χορηγήστε άνθρακα σε αρκετή ποσότητα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλανίνη
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 - 7793777


Παρασκευαστής - Τυποποιητής - Συσκευαστής:

SPIESS © URANIA

Kontroll-Marke 10 x 4
Klebenahtzugabe



Druck 10 mm in den Beutelboden



Bodenkante

Kontroll-Marke für Beschnitt 10x2 mm

untere Formatkante

Papierbahnbreite nach dem Druck 596 mm

Papierbahnbreite vor dem Druck 601 mm

Abschnittlänge 460

Beutelhöhe 397

Saumzugabe

Schneidekante

Beutelkante

Beutelboden 63

Abstand vom Boden = 82 mm