ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•*Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.* •*Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.* •*Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.* •*Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.* •*Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.* •*Χρησιμοποιείστε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.* •*Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.* •*Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.* •*Αποφύγετε την ελευθερωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.*

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: *Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).*

Επαφή με τα μάτια: *Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.*

Κατάποση: *Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην προκαλέσετε εμετό.*

Επαφή με το δέρμα: *Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.*

Αναπνοή: *Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από την υποθερμία. Συμβουλευτείτε προληπτικά γιατρό.*

Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή – Αντίδοτο: *Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.*

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμοί φυλλώματος.*

Τρόπος δράσης: *Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε κατά το 1/2 - 2/3 το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Ανακινείστε τις φιάλες με το σκεύασμα και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα. Ξεπλύντε τα κενά συσκευασίας πολλές φορές και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε με νερό με συνεχή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Η απόσυρση/καταστροφή του FUSILADE πρέπει να γίνεται σε υψικάμινο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές προφυλάξεις για τα Ζιζανιοκτόνα:
•*Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.*
•*Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.*
•*Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του.*
•*Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη.*
•*Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.*
•*Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.*
•*Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.*
•*Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.*
•*Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI).*
•*Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.*
•*Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.*
•*Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.*

L171536 GREC/4R

Fusilade®

12,5 EC

syngenta®

Fluazifop-P-Butyl

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Αναπ. & Τροφ.: 7324/08-12-1983

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Fluazifop-P-butyl 12,5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 85,05% β/β

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ***Syngenta Hellas A.E.B.E.***
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- *Ερεθίζει το δέρμα.*
- *Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.*

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- *Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.*

TM

Φυτοτοξικότητα: *Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Ζαχαρότευτλα, Τομάτα υπαίθρου βιομηχανική: *90 ημέρες,* ***Αμπέλι:*** *120 ημέρες,*
Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι: *30 ημέρες,* ***Πατάτα:*** *50 ημέρες,*
Σόφια, ηλίανθος, τριφύλλι, καπνός: *60 ημέρες,* ***Φακή:*** *45 ημέρες,* ***Μαρούλι:*** *42 ημέρες.*

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Ζαχαρότευτλα: *Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena spp.), Μουχρίτσα (Echinochloa spp.), Σετάρια (Setaria spp.) 100-200[1] κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.*
Αμπέλι (για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): *Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: για Βέλιουρα (Sorghum spp.) 600 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα και για Αγριάδα (Cynodon dactylon) 800-1000 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).*
Εσπεριδοειδή: ***Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά:*** *Για* ***α)*** *Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια και* ***β)*** *Πολυετή[5] αγρωστώδη ζιζάνια 60-120[2] κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή ως εξής:* ***α)*** *όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα ή* ***β)*** *όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).*
Βαμβάκι, Τριφύλλι για σπόρο, Καπνός, Σόγια, Ηλίανθος, Πατάτα, Φακή: *Για* ***α)*** *Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια και* ***β)*** *Πολυετή[3] αγρωστώδη ζιζάνια 100-250[2] κ.εκ./στρέμμα (max) (απαιτείται προσθήκη ελαίου ή διαβρεκτικού) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή ως εξής:* ***α)*** *όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα ή* ***β)*** *όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).*
Μαρούλι: *Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 125-150 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.*
Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.
Τομάτα Υπαίθρου (Βιομηχανική): *Για Ετήσια αγρωστώδη* ζιζάνια *125-150 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.*
Για Βέλιουρα 150-200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν ο Βέλιουρας βρίσκεται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.

Παρατηρήσεις:
1. *Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα.*
2. *Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.*
3. *Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua).*
4. *Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), αλεπονούρα (Alopecurus spp.), αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.).*
5. *Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.*
6. *Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνήθεις θερμοκρασίες.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: