

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. •Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. •Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώσουν τα ψεκαστικά δόλια. •Το υλικό και οι περιέκτες του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελεύθερησή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: **Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

•**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμείνει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. •**Σε περίπτωση εισπνοής:** Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. •**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. •**Σε περίπτωση κατάποσης:** Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

• Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζυζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζυζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

• Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΒΟΜΒΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ.

• Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν ανέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τη μη γεωργική γη για την καλλιέργεια του αμπελιού και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ανέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.



FAS/TAC® 10 EC

Alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν) 10% Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: Alphacypermethrin 10% β/ο,
 Βοηθητικές ουσίες 88,61% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομαχίου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

•Εύφλεκτο. •Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. •Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. •Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. •Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. •Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. •Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. •Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14334/20-8-2009

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 400 κ.εκ.

ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

©Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Αμπέλι:** *Ευδελμία, Κοχλίδα, Πυραλίδα.* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών με δόση 15 κ.κ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Τομάτα (υπαίθρου):** *Αλευρώδεις.* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι ύψος 50 εκ. με δόση 15 κ.κ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πατάτα:** *Δορυφόρος.* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι ύψος 50 εκ. με δόση 15 κ.κ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Ελαιοκάρφη:** *Κολέοπτέρα (Psylliodes chryscephala, Meligethes aeneus).* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών με δόση 10 κ.κ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες για ψεκασμό με άλλο εντομοκτόνο εφόσον απαιτείται. **Σιτάρι:** *Αφίδες.* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών με δόση 15 κ.κ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Αραβόσιτος:** *Κοχλίδα.* Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών με δόση 30 κ.κ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες για ψεκασμό με άλλο εντομοκτόνο εφόσον απαιτείται. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπέλους στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FASTAC 10 EC. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΕΤΟΚΙΤΗΤΑΣ:** •Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθούν οι αριθμοί των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. •Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιομορφή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με FASTAC 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την αντιστοιχόμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ:** **Αμπέλι, Τομάτα (υπαίθρου):** 7 ημέρες, **Πατάτα, Αραβόσιτος:** 14 ημέρες. **Ελαιοκάρφη:** 49 ημέρες, **Σιτάρι:** 42 ημέρες. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις αντιστοιχόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται από πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται στα σημεία συλλογής να ρίχνουμε για ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Πηρώσεως: 05 από μέρος συσκευασίας
 Ηλ. Παρασκευής: 05 από μέρος συσκευασίας
 Ηλ. Λήξης: 05 από μέρος συσκευασίας

