

Fluidosoufre®

Fluidosoufre®

Fluidosoufre® 99DP

Θείο εξάχνωσης (άνθη θείου) 99%
Σκόνη επίπασης

Εγγυημένη σύνθεση: **Θείο εξάχνωσης (άνθη θείου)** 99% β/β
Βοηθητικές ουσίες: -

Αρ.Έγκρ.Κυκλόφ.: 6442/09.07.1984/11.05.2009

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

ΦΛΟΥΙΝΤΟΣΟΥΦΡ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Με επίπαση, ως έχει.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Σίδιο, Δόση: 2-3,5 κιλό/στρ. Εφαρμογές από την ανθοφορία και μέχρι τις αρχές Ιουνίου, κάθε 10-12 ημέρες.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Σίδιο, Δόση: 2-3,5 κιλό/στρ. Εφαρμογές από την εμφάνιση των φύλλων και μέχρι 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή, κάθε 10-12 ημέρες. **ΑΜΠΕΛΙ (Εμπειροπείρα & Οικονομολογία σταφυλιών):** Σίδιο, Δόση: οι 1,5-2 κιλό/στρ. Εφαρμογή στην αρχή της βλάστησης Ιστιάδιο ζου φύλλων, βί 2-3 κιλό/στρ. Εφαρμογή κατά την άνθηση, γί 2,5-3,5 κιλό/στρ. Εφαρμογή πριν την καρπώδεια. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο-Τομάτο-Αγγούρι-Κολοκύθα-Καρπούζι-Πεπόνι-Μπιζέλι):** Σίδιο, Δόση: 1,5-2,5 κιλό/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής, ανά 10-15 ημέρες. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Σίδιο, Δόση: 1,5-2,5 κιλό/στρ. Εφαρμογές προληπτικά, μόλις οι βλαστοί αποκτάσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθημερινική περίοδος Τέσσερις (4).

Παρατηρήσεις:

•Το εύρος της δόσης είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. •Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. •Στις καλλιέργειες Μηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι και Λαχανικά υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προεδιοποιήσεων. •Το θείο έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων. •Το θείοφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. •ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη γίνεται επίπαση σε υγρό φυτό, δηλαδή με την πρωινή δροσιά, με οικηλώδη καιρό ή μετά από βροχή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή ποττού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες.

© Marque déposée Cerexagri

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Μη φοράτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Μη ρίχνετε υπολείμματα στην αποχέτευση. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση. •Το προϊόν και ο περιέκτης του να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακλόνητα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΙ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν περωθεί με το σκεύασμα. Στη συνέχεια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης, πείτε δύο ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μην δίνετε τίποτε από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει ειδικό antidote. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 0778377

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκίδια, σάκκοι μαζί με το κουτί, αφού καταστραφούν προηγουμένως με ακίδιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτός. Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



Κάτοχος της Έγκρισης-Παράστασης για την τελική συσκευασία και σύμμοση-Παρασκευαστής-Συσκευαστής: Cerexagri S.A. - Γαλλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας-Διευθυντής: **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΣΘΙΑ ΛΕΒΕ**
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211203555, Φαξ: 211203559
Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1545, Τ.Κ. 57038 Ιωάνη
Τηλ.: 2510784951-6, Φαξ: 2510780453
Εργοστάσιο: Οικόμνητα Βολιώτης



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 10 ΚΙΛΑ



01/2009-6
135-100167-02-2009 (ref. text)

Fluidosoufre®

Fluidosoufre®