

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα. Εφόσον προκύψουν δυσκολίες ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε από το στόμα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Σε επαφή με το δέρμα: Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2 – 3 atm).
- Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστώνται.
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα σε άφθονο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, μακριά από θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25 °C και πηγές ανάφλεξης.



FOCUS® 10 EC

Cycloxydim (Σαϊκλοξιντρίμ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Cycloxydim 10% β/ο (χημική ομάδα: cyclohexanones)
Βοηθητικές ουσίες 88,8% β/β

Εκλεκτικό, δισυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια σε πλατύφυλλες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ερεθίζει το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 7671/30-01-2008

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **1** λίτρο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ- ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

BASF SE, Γερμανία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

BASF SE, Γερμανία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή,
τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το FOCUS 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των οξιμών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαισθητών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνεζίνιου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια), Τομάτα υπαίθρου, Μαρούλι, Βαμβάκι, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα, Φασόλια (με λοβό, όσπριο):

1) Για την καταπολέμηση της Μουχρίτσας. Δόση: 200 κ.εκ./στρέμμα. Ψεκασμός μεταφυτρωτικά από το στάδιο των δύο (2) φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος της μουχρίτσας. **2)** Για την καταπολέμηση του Βέλιουρα από ρίζωμα. Δόση: 300 κ.εκ./στρέμμα. Ψεκασμός μεταφυτρωτικά όταν ο βέλιουρας έχει ύψος 20-40 εκ. **3)** Για την καταπολέμηση της Αγριόδας. Δόση: 400 κ.εκ./στρέμμα. Ψεκασμός μεταφυτρωτικά όταν η αγριόδα έχει μήκος σtolώνων 10-20 εκ.

Αρακάς (με λοβό, όσπριο):

Για την καταπολέμηση της Μουχρίτσας. Δόση: 200 κ.εκ./στρέμμα. Ψεκασμός μεταφυτρωτικά από το στάδιο των δύο (2) φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος της μουχρίτσας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

1. Οι εφαρμογές με το FOCUS 10 EC να γίνονται κατά προτίμηση κατά τη δύση του ηλίου και όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρόγο του. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 15 – 25 °C.
2. Για καλύτερο έλεγχο των πολυετών ζιζανίων, ιδιαίτερα όταν οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την απορρόφηση και την μετακίνηση του ζιζανιοκτόνου, συνιστάται να γίνονται δύο εφαρμογές με τη μισή δοσολογία η κάθε μία, με μεσοδιάστημα 15 – 30 ημερών.
3. Το FOCUS 10 EC να μην εφαρμόζεται σε ασθενικές καλλιέργειες και όταν αναμένεται βροχοπτώση μέσα στις επόμενες 2 ώρες από την εφαρμογή του.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης μιας καλλιέργειας στην οποία έχει εφαρμοστεί FOCUS 10 EC είναι δυνατή η φύτευση όλων των δικυτλιθιδίων φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μέχρι 3 atm. Με όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το προϊόν είναι φυτοτοξικό για τα σιτηρά και όλες τις αγρωστώδεις καλλιέργειες. Φροντίστε έτσι ώστε το ψεκαστικό υγρό να μην μεταφέρεται με τον άνεμο σε γειτονικές, ευαίσθητες καλλιέργειες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 42 ημέρες. Τομάτα υπαίθρου: 35 ημέρες. Μαρούλι: 28 ημέρες. Φασόλια και αρακάς που προορίζονται για όσπρια: 56 ημέρες. Πράσινα φασόλια με λοβό και φρέσκος αρακάς με λοβό: 28 ημέρες. Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Πατάτα: δεν ορίζεται.