



Φολικούρ 25 EW

Το Folicur 25 EW ανήκει στην ομάδα των DMIs, (υποομάδα τριαζολών) με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιόμυκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλώσης του C-14.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως, **ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΜΗΛΙΑ: Φουζκλάδιο (*Venturia inaequalis*). Δύο (2) εφαρμογές, α. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. β. Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (40-100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: *(Sphaerotheca pannosa)*. Δύο (2) εφαρμογές από το στάδιο εμφάνισης του καρπιδίου και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (75-100 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-200 λίτρα/στρέμμα. **Μονίλια καρπών (*Monilinia laxa*):** Μία (1) εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνον εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή τους. **Δόση:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερό (75-150 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-200 λίτρα/στρέμμα.

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience



ΑΜΠΕΛΙ: Οίδιο (*Uncinula necator*). Δύο (2) εφαρμογές από το στάδιο της καρπώσεως μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες. **Δόση:** 40 κ.εκ./100 λίτρα νερό (32-40 κ.εκ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*). Τρεις (3) εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ανά 14 ημέρες. **Δόση:** 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100 κ.εκ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μηλιά 2, Ροδακινιά-Νεκταρινιά 2, Αμπέλι 2, Σπαράγγι 3.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά: 35 ημέρες, Ροδακινιά-Νεκταρινιά: 7 ημέρες, Αμπέλι: 21 ημέρες, Σπαράγγι: 6 μήνες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Χρήση του Φολικούρ 25 EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρχνομε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε συνθήκες θερμοκρασία (ήπιο κλίμα). Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης - Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



200 κ.εκ. e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6852/24-1-2002

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγ.Σύνθεση: tebuconazole (τεμπουκοναζόλ) 25% β/ο
Βοηθ.ουσίες: 72,87% β/β

**Διασυστηματικό
Μυκητοκτόνο**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

• Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης

• Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών

• Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Xn



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδωμένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

N 07 2884 10

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE