

Xi



**ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Ελβετία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: STI SOLFOTECNICA Italiana S.p.A., Ιταλία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: K+N EYΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, Σίνδος Θεσσαλονίκης

Dimethomorph (Ντιμεθομόρφ) + Copper oxychloride (Χαλκός)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Dimethomorph 6% β/β

(αμίδιο του κυνναμικού οξέος)

Μεταλλικός χαλκός 40% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού

(ανόργανα άλατα χαλκού)

Βοηθητικές ουσίες: 23.60 % β/β

**Μίγμα δύο μυκητοκτόνων,
του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου
με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση
και του οξυχλωριούχου χαλκού, μυκητοκτόνου επαφής,
με προληπτική δράση.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ερεθίζει τα μάτια.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6901/17-04-2003

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 3 κιλά

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
 - Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
 - Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
 - Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
 - Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε επαφή με το δέρμα: Πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε επαφή με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Οι δόσεις αφορούν το σκεύασμα)

ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): *Περωνόσπορος (Plasmopara viticola)*. Δόση: 300-350 γρ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Προληπτικές εφαρμογές μετά την άνθηση και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από το dimethomorph. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 50-100 λίτρα.
ΠΑΤΑΤΑ: *Περωνόσπορος (Phytophthora infestans)*. Δόση: 300 γρ. ανά στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική χημική ομάδα από το dimethomorph. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 50-100 λίτρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Η δόση είναι ανάλογη με την ένταση της προσβολής και του μεσοδιαστήματος. Εφόσον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, επεμβαίνουμε με την μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα. (2) Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3 ενώ το σύστημα ανάδευσης είναι ακίνητο. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού έχουμε θέσει σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Αμπέλι, Πατάτα: 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως ο Βορδιγάλειος πολτός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό και προστατευόμενο από την υγρασία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.