

**ΠΡΟΪΟΝ:**
GALAXIA SL

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλαστή και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, όπου ανατρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2 – 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με δραστικές ουσίες Glyphosate 18% (24,29% β/ο υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης) + MCPA 18% (23,30% β/ο υπό μορφής άλατος ισοπροπυλαμίνης) και 66.5 % β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: AFRASA S.A.**Διανομή:** FARMA-CHEM S.A.**Σταθερότητα στην αποθήκευση:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα			
Εσπεριδοειδ ή - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιπ Φρουτ - Κίτρα (άνω των 3 ετών)	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια	400 – 600 600	30 - 50		Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)	1-2
Μηλιά, Αχλαδιά (άνω των 3 ετών)	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	30 - 50		Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους	1-2

	Πολυετή ζιζάνια	600			ανάπτυξης (Άνοιξη- Καλοκαίρι)	
Ελιά (άνω των 3 ετών)	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	30 - 50		Κατευθυνόμενος ψεκασμός την άνοιξη και το φθινόπωρο	1-2
	Πολυετή ζιζάνια	600				

Παρατηρήσεις:

1. Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών).
2. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:

Ετήσια Πλατύφυλλα:

Amaranthus spp. (Βλήτο), Conyza canadensis (Κόνυζα), Medicago arabica (Αγριομηδική), Veronica sp (Βερόνικα), Stellaria media (Στελλάρινα), Sinapis alba (Ημερο σινάπι), Sonchus oleraceus (Ζωχός), Erigeron spp.

Ετήσια Αγρωστώδη: Bromus sp. (Βρόμος), Poa annua (Κοινή πόα), Setaria spp (Σετάρια), Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα), Lolium spp. (Ηρα).

Πολυετή ζιζάνια: Cynodon dactylon (Αγριάδα), Trifolium repens (Αγριοτρίφυλλο), Oxalis per carpa (Οξαλίδα), Plantago spp. (Πεντάνευρο).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
2. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπωρώνες από το 3ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
3. Πριν την εφαρμογή αφαιρέστε τις παραφυάδες.
4. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
6. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 4 μήνες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσώρευσης υπολειμμάτων τους

καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Είναι φυτοτοξικό στην καλλιέργεια της μηδικής. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά κ.α. γι' αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερρομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος.

Συνδυαστικότητα:

Δε συνιστάται η ανάμιξη με άλλα σκευάσματα

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή: 15. Μηλοειδή: 15. Ελιά: 15.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.