

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και τον ψεκασμό. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Σε περίπτωση δηλητηρίασης, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΤΙΧΤΟ ΤΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΙΑ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΜΗΝ ΨΕΚΑΣΕΤΕ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

•Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
•Χρησιμοποιήστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην σπένετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.
•Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. •Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Αν ρυπαίνονται τα νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. •Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 psi). •Χρησιμοποιήστε μικρό τύπου σκούπας. •Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορριπτεμένο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποθεθούν όσα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Εγγυημένη σύνθεση: **Oxyfluorfen 24% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 74,7% β/β

Περιέχει Ξυλόλην & N-methyl pirrolidone

Αρ. Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 7527/27.3.98/08

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και ηλιαφυλλών ζιζανίων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΑΤΕ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ



Παρασκευαστής:
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Ισραήλ

Κάτοχος της
έγκρισης-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Galigan®

Oxyfluorfen (Οξυφλουορφέν) 24%
Υγρό γαλακτωματοποιίσιμο

ΓΚΑΛΙΓΑΝ:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και ηλιαφυλλών ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα με μικρό τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 2 atm. Ειδικά για τον καιρό, εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, με 20-40 λίτρα νερό/στρ. σε εδάφος ψιλοχωματισμένο και αποξηγμένο από τα ζιζάνια. Εφαρμογή κατά το καλλιεργώ ή "γέμισμα" με κοτευσυνομένο ψεκασμό του εδάφους μεταξύ των γραμμών. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση, με μικρό τύπου σκούπας και με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρησιμοποιήσετε. Γεμίστε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Ξεπλύνετε τα κενά υλικά συσκευασίας ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΠΙΠΕΔΙΟΙΔΗ (Ποτακάλη-Μαντολάρι-Λεμονιά-Γκρέι φρουτ-Κίτρι) - **ΜΗΛΟΙΔΗ (Μηλιά-Αχλάδι)** - **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινά-Βερυκοκιά-Δαμασκηνιά-Νεκταρινιά-Κορυμπιά-Κερασιά-Βυσσινιά)** - **ΑΜΠΕΛΙΑ (Σταφίδες-Οινοποιήσιμο-Επιτραπέζιο)** - **ΕΛΙΑ:** Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Προφύλαξη (2^η), **ΚΡΑΜΒΕΣ (Κουνουπίδι-Λάχανο)** - **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ:** Δόση: 250-300 κ.εκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση. **ΑΓΓΙΝΑΡΑ:** Δόση: 300 κ.εκ./στρ. Προ της βλάστησης του ξηροφύτου. **ΚΡΕΜΜΥΔΑ:** Δόση: 150 κ.εκ./στρ. α) Μεταφύτευτικά ως προς την καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 φυλλών (στο κρεμμυδί από σπόρο), β) Εντός δύο (2) ημερών από τη φύτευση (στο κρεμμυδί από κοκκάρ). **ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Δόση: 100 κ.εκ./στρ. Μετά τη σπορά και πριν το φύτεμα της καλλιέργειας. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Δόση: 100-300 κ.εκ./στρ. Πριν το φύτεμα της καλλιέργειας. **ΚΑΠΝΟΣ:** α) Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση: α1) Ανατολικά και β) Βιστζίνια: 200-300 κ.εκ./στρ. α2) Καπνά Burley: 300-400 κ.εκ./στρ. β) Κατά το παράκωμο ή "γέμισμα" με κοτευσυνομένο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών: β1) Ανατολικά και β2) Καπνά Burley: 200-300 κ.εκ./στρ. **ΥΓΡΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟΥ (Λίτρα/στρέμμα):** Επεριδοειδή-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα -Λιμνίη- Ελιές-Κράμβες-Μελιτζάνα-Αγγινάρα-Κρεμμύδι-Ηλιάνθος-Βαμβάκι (30-60), Καπνός (20-40). **Αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδος:** Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. 2) Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο. 3) Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 4) Το γιγέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστηλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. 5) Για τις Κράμβες και τη Μελιτζάνα, η μεγάλη δόσολογία εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης. 6) Να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμυδί που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βοτάνων. 7) Στο κρεμμυδί να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό. 8) Όταν πλησθόν άσπρη μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δόρα φυτοτοξικά. 9) **Καταπολέμηση ζιζανίων:** Αρόδρα, Αγριομυελιτζάνα, Αγριομυελιτζάνα, Αμυγδαλόχορτο, Αφειονοφύλα, Αντράκη, Βέλλουρας από σπόρο, Βερνίκια, Δωδεκάνη, Ελευσίν, Ζωαί, Ήρε, Κίληρα, Λουμπούδι, Μαρτιάκος, Μεγάλο Βίλητο, Μικρή τσουκνίδα, Μουχρίδα, Οξυλίδα, Ροπαλιά, Στάριες, Στεφάνια, Στύγιος, Τάτορας, Τριβίλι, Φουσίδα, Περιηλοκάδα. 10) **Ανθεκτικά ζιζάνια:** Καλντουίλη (Calendula arvensis), Λάπαθα (Rumex spp.).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Κρεμμύδι: 60 ημέρες. Καπνός: 60 ημέρες. Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα ακόμη και από σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον Ηλιάνθο, δόση μεγαλύτερη από 120 κ.εκ./στρ. δόρα φυτοτοξικά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απορραβιστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό και ξηρό, άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεση του στο φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.