ΧΙ

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΕΔΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΑ

ΦΥΑΣΕΤΟ ΧΑΝΕΙΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΙΛΟΝ

Τζιμπριφάρ

GIBAIFAR 10 TB

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο ωριμοποίησης ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΔΙΣΚΙΑ (ΤΒ)

GIBBERELLIC ACID (ΓΙΒΕΡΕΛΛΙΚΟ ΟΞΥ) 10% Ελευθερη γιββερελλικη οξυ: 89,25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 89,25% β/β

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 8154 / 26-9-2005

Κατοχος της Εγκρισης - Υπευθυνος για οικονομικα θεματα – Υπευθυνος για τη τελικη συσκευασια και ετικετα:

AFAR AGROCHEMICAL SRL, Via Buzzano 12, Rimini Scivia, Genoa, Italy.

Υπευθυνος επικοινωνιας: Λιοπρίχλιανος Α.Ε. Μεταμορφ.Ο.9, 10674 Αθηνα.

Διανομεας:

YVILON®

Α.Γ.Λιανου 32, Βολιγοπη, Θεσσαλονικη, 542 49 Τηλ. 2310 311377, Fax: 2310 343478

e-mail: ypsilon@hypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο (Contents) : **10 δισκία (10 γραμ./δισκίο)**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπ φρούτ για παράταση του χρόνου συγκομιδής με 1 - 1.5 δισκία/100 λίτρα νερο (200-400 λίτρα ψεκαστ. υγρό/ στρέμμα). 1 εφαρμογή όταν οι καρποί στην περιφέρειαι του δένδρου εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια κιτρινίσματος. **Λεμόνια:** για **1) συντήρηση του χρόνου συγκομιδής σε πολύφορες ποικιλίες, 2) καθυστέρηση της συγκομιδής, 3) αύξηση του μεγέθους του καρπού** με 0,5-1 δισκία/100 λίτρα νερό (200-300 λίτρα ψεκαστ. υγρό/ στρέμμα). 1 εφαρμογή όταν οι περισσότερα καρποί έχουν χρώμα από βαθύ πράσινο ως ελαφρύ κίτρινο. **Κλημεντίνες:** για **1) αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δέντρα με χαμηλή παραγωγικότητα** με 1-2.5 δισκία / 100 λίτρα νερό (200-300 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα). 1 εφαρμογή στην πλήρη άνθηση 2) **παράταση το χρόνου συγκομιδής** με 1 δισκία / 100 λίτρα νερό (200-300 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή αφού συγκομιστούν οι καρποί που βρίσκονται στην περιφέρεια του δέντρου και ωριμάζουν νωρίς. **Πορτοκάλια (εκτός ποικιλίας Valencia):** για **1) παράταση του χρόνου συγκομιδής 2) βελτίωση της ανταχής του φλοιού του καρπού κατά τη παραμονή στο δέντρο** με 1 δισκία/100 λίτρα νερό (300- 400 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή μόλις το χρώμα του καρπού αρχίζει να αλλάζει από πράσινο σε κιτρινωπό (όσν δεν επιθυμείτε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το ευπορικό χρώμα τους) **3) περισσοτερο των απαλεκών που οφείλονται σε ρυπίδωση ή « φούσκωμα» του φλοιού κατά την επιχή της συγκομιδής** με 1-2 δισκία / 100 λίτρα νερό (300-400 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή 3-6 εβδομάδες πρίν από την άλλαγή του χρώματος. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αγλάνδε:** για **1) αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλες που δε δένουν ικανοποιητικά** με 0.5 δισκία/100 λίτρα νερό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή στην αρχή της ανθησης; **2) ικανοποιητική καρπόδεση μετά την καταστροφή των ανθέων από παγετο (παραπάνω 1)** με 1.5-2.5 δισκία/100 λίτρα νερό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή στην αρχή της ανθησης. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Κεράσια:** για **1) αύξηση της καρπόδεσης** με 1-2 δισκία / 100 λίτρα νερό (150 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή στην αρχή της ανθησης. **Μπιζελιά:** για **1) αύξηση του μεγέθους του καρπού και βελτίωση της ανταχής του φλοιού** με 1.5-2.5 δισκία / 100 λίτρα νερό (150 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή όταν τα καρόδια έχουν χρώμα ανοικτό πράσινο προς ωχρόμαυρο. **ΑΜΠΕΛΙ: Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση: για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δεν δένουν** με 2-4 δισκία/100 λίτρα νερό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 2 εφαρμογές στο διάστημα από την πλήρη άνθηση (όταν δηλαδή το 70% των πιλιδίων έχει πέσει) και μέχρις ότου οι ρόγες αποκτήσουν μέγεθος 3mm (σκάγιού) **(Παραπάνω 2). Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας:** για **αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ρόγας, όταν είναι μικρότερο του κανονικού** με 0,2-0,8 δισκία /100 λίτρα νερό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή κατά τα δέσιμο και όταν οι ρόγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3mm (σκάγιού). **Μαύρη Κορινθιακή (σταφίδα):** για **βελτίωση της ποιότητας και αποφυγή του ανομόιομου των ρογών** με 0,1-0.5 δισκία/100 λίτρα νερό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή όταν έχουν πέσει όλα τα πιλίδια. **Φράουλα:** για **πρωίμιση και αύξηση της παραγωγής σε περιοχές που το ψύχος δεν είναι επαρκές (πρώιμες χειμωνιάτικες καλλιέργειες σε υπαιθρσπικά κλίματα)** με 1.5-2.5 δισκία / 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή 3-4 εβδομάδες πριν από την εναρξή της ανθησης; **ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Πικραρί:** για **πρωίμιση ή αύξηση της παραγωγής** με 1.5-3 δισκία / 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή όταν τα μισά περίπου ανθή έχουν δέσει. **Σέλινο:** για **πρωίμιση ή αύξηση της παραγωγής** με 2.5-5 δισκία / 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με 1 εφαρμογή 4 εβδομάδες πρίν τη συγκομιδή. **Αγκινάρα:** για **πρωίμιση, για βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγής** με 0,25-0.5 δισκία/100 λίτρα νερό (40-50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) μέχρι 3 εφαρμογές όταν εμφανιστούν 6 - 8 φύλλα ή 8 - 12 φύλλα για φετά ενός έτους (παραπάνω 3). **Πατάτα: για προβλαστηση του πατατοσπορου και για αυξηση της παραγωγης** με 1 δισκιο / 600 λιτρα νερο - βυθιστε τους κονδυλους (1 εφαρμογη) ειτε καμενους ειτε ομη για 4 λεπτα σε διαλυμα του ανελοαματος; **ΚΑΛΛΟΣΠΕΤΚΙΚΑ: Ανεμώνες:** για **ωραιοτερα ανθη και επιμηκυνση των ανθοφορων στελεχων** με μια εφαρμογή με 2.5 δισκία/ 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) όταν οι πρώτες καρποφόρες ανθίλώτες είναι μόλις ορατές. **Ίρις:** για **πρωίμιση της άνθησης και επιμήκυνση του ανθοφόρου στελέχους** με 10 δισκία / 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) για εμβάπτιση (1 εφαρμογή) των βολβών για 20 λεπτά σε διάλυμα του ανελοαματος μετά από διατήρησή τους σε θερμοκρασία 8-13°C για 45 ημέρες και αμέσως μετά φύτευση ή 25 δισκία / 100 λίτρα νερό (50 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα) με ψεκασμό (1 εφαρμογή) με το ανελοαματο μετα από διατηρηση των φυλλων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε και μην καπνίζετε. ● Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση ατυχήματος, ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

Ημερ. Παρασκευής (Prod. Date) :
Αριθ. Παρτίδας (Lot No.) :

YVILON®

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Σε χωριστό δοχείο διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκεύασματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίχνουμε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρείς φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό.

ΦΥΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και στο συνιστώμενο χρόνο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδιάζεται με τα περισσότερα ψεκαστικά διαλύματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά δεν πρέπει να συνδιάζεται με αλκαλικής αντίδρασης ψεκαστικά υγρά (άσβεστος, θείο κλπ).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία πάνω από 0° C και κάτω από 32°C μακριά από άμεσο ηλιακό φώς,πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σέλινο: 7 ημέρες

Περιεχόμενο (Content) : **10 δισκία (10 γραμ./δισκίο)**

YVILON®

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το σκεύασμα συνιστάται να εφαρμόζεται με προαθήκη προσκολλητικού στις καλλιέργειες. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του προσκολλητικού. **(1)** Πρέπει να προσέξετε ώστε να μη συμβεί υπερβολική καρπόδεση. **(2)** Προσέξτε ώστε να βραχούν καλά τα ταραμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε δυο φορές: α) όταν το 70% των πυλιδίων έχει πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β) κατά την καρπόδεση, δηλαδή 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής. **(3)** Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί η επαρκής άρδευση. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση. Εάν το νερό άρδευσης είναι αλατούχο, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ πρώιμη χρήση του σκευάσματος.