

ΓΙΒΒΕΡΕΛΙΚΟ ΟΞΥ GREENFARM:

Φυτορρυθμιστική ουσία, η οποία επηρεάζει τον ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλλιεργειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΜΑΤΩΣ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τον απαιτούμενο αριθμό δοκιών με μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα αυτό στο ψεκαστικό δοχείο αναδενδρώντας. Ξεπλύνετε το δοχείο και ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Σημειώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδενδρώντας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (Δοσολόγιο 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΓΚΡΕΠ ΦΡΟΥΤ: Παράταση του χρόνου συγκομιδής. Δόση: 1-1,5. Εφαρμογή όταν οι καρποί στην περιφέρεια του δένδρου εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα κτριμωγιάς. **ΛΕΜΟΝΙΑ:** Συντόμηση του χρόνου συγκομιδής σε πολυφόρες ποικιλίες. Καθυστέρηση της συγκομιδής σε όλες τις ποικιλίες. Αύξηση μεγέθους καρπού. Δόση: 0,5-1. Εφαρμογή όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν χρώμα από βαθύ πράσινο έως ελαφρό κίτρινο. **ΚΑΛΗΜΕΝΤΙΝΕ:** α) Αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δένδρα με χαμηλή παραγωγικότητα. Δόση: 1-2,5. Εφαρμογή στην πλήρη άνθηση. β) Παράταση του χρόνου συγκομιδής. Δόση: 1. Εφαρμογή αφού συγκομίστηκε το κάρσι, α) οπού βρίσκονται στην περιφέρεια του δένδρου και α) οπού κυμαζούν χωρίς. **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (επίσης ποικιλίες Valencia):** α) Παράταση χρόνου συγκομιδής. β) Αύξηση της αντοχής του φρούτου του καρπού κατά την παραγωγή στο δένδρο. Δόση: 1. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε μόλις το χρώμα του καρπού αρχίζει να αλλάζει από πράσινο σε κτριμωγιά. Εάν δεν επιδιώκετε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το εμπορικό χρώμα τους. β) Περιορισμός απειλών που οφείλονται σε ρυτίδωση ή "φρούσκωμα" του φρούτου κατά την εποχή της συγκομιδής. Δόση: 1-2. Εφαρμογή 3-6 εβδομάδες πριν από την αλλαγή του χρώματος. **ΑΧΛΙΑΔΙΑ:** α) Αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν ικανοποιητικά. Δόση: 0,5. β) Ικανοποιητική καρπόδεση μετά την καταστροφή των ανθέων από παγετό¹⁾. Δόση: 1,5-2,5. Εφαρμογή στην αρχή της άνθησης. **ΚΕΡΑΣΙΑ:** α) Αύξηση της καρπόδεσης. Δόση: 1-2. Εφαρμογή στα τέλη της άνθησης. β) Αύξηση του μεγέθους του καρπού και βελτίωση της αντοχής του φρούτου. Δόση: 1,5-2,5. Εφαρμογή όταν τα κεράσια έχουν χρώμα ανοικτό πράσινο προς ακυρώδες. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιπαραδείγματα σουλτανίνα):** Αύξηση ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν. Δόση: 2-4. Εφαρμογή στο διάστημα από την πλήρη άνθηση (όταν δηλαδή το 70% των φυλλών έχει πέσει) και μέχρις ότου οι ράγες αποκόψουν μέγεθος 3 χιλ. (οκαγίου)²⁾. **ΑΜΠΕΛΙ (Σουλτανίνα για σταφίδα):** Αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ράγας, όταν είναι μικρότερο του κανονικού. Δόση: 0,2-0,8. Εφαρμογή κατά το δέσιμο και όταν οι ράγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3 χιλ. (οκαγίου). **ΑΜΠΕΛΙ (Μαύρη Κορινθιακή σταφίδα):** Βελτίωση της ποιότητας και αποφυγή του σκαλίσματος των ραγών. Δόση: 0,1-0,5. Ψεκάστε προεκτάκι με το σκεύασμα, όταν έχουν πέσει όλα τα φυλλώδη.

ΦΡΑΓΙΑ: Προώθηση και αύξηση της παραγωγής σε περιοχές που το ψέκος δεν είναι επαρκές (πρώιμες, με κλιματικές αλλαγές σε υπερακτική κλίμακα). Δόση: 1,5-2,5. Εφαρμογή 3-4 εβδομάδες πριν από την έναρξη της άνθησης. **ΠΙΝΕΡΙΑ:** Προώθηση ή αύξηση της παραγωγής. Δόση: 1-5,3. Εφαρμογή όταν το μισό πράσινο δέντρο έχει κάνει βόσος. **ΣΕΛΙΝΟ:** Προώθηση ή αύξηση της παραγωγής. Δόση: 2,5-5. Εφαρμογή 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. **ΑΓΓΙΝΑΡΑ:** Προώθηση της ανάπτυξης. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγής. Δόση: 0,25-0,5 (σε 15 λίτρα νερό). Όταν εμφανισθούν 6-8 φυλλώδη ή 8-12 φυλλώδη για φυτά 1 έτους³⁾. **ΠΑΤΑΤΑ:** Προβόληση του πατατόσπορου και αύξηση της παραγωγής. Δόση: 1 (σε 600 λίτρα νερό). Βυθίστε τους κονδυλίους είτε κομμένους είτε όλη για 4 λεπτά σε διάλυμα του σκευάσματος. **ΑΝΕΜΩΝΕΣ:** Ωρίστερα άνθη και επιμήκυνση των ανθοφόρων στελέχων. Δόση: 2,5. Εφαρμογή όταν ο πρώτος καρποφόρος σφαιλίδος είναι μόλις ορατός. **ΙΡΙΔΕ:** Προώθηση της άνθησης και επιμήκυνση του ανθοφόρου στελέχους. α) Δόση: 10. Εμβάπτιση των βοτάνων για 20 ώρες σε διάλυμα του σκευάσματος μετά από διατήρησή τους σε θερμοκρασία 8-13°C για 45 ημέρες και αμέσως μετά φύτευση. ή) Δόση: 25. Ψεκάστε με το σκεύασμα μετά την έκπτυξη των φυλλών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):
Γκρέπ-φρούτ (200-400), Λεμόνια-Κλημεντίνες (200-300), Πορτοκαλιά (300-400), Αχλιάδια-Αμπέλι (100), Κεράσια (150), Φρούδια-Πιπεριά-Σέλινο-Ανεμώνες-Ιρις (50), Αγγινάρα (40-50).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:
Γκρέπ φρούτ-Λεμόνια-Κλημεντίνες-Πορτοκαλιά-Αχλιάδια-Κεράσια-Σουλτανίνα για σταφίδα-Μαύρη κορινθιακή (σταφίδα)-Φρούδια-Πιπεριά-Σέλινο-Πατάτα-Ανεμώνες-Ιρις (1), Σουλτανίνα για επιπαραδείγματα χρήση (2), Αγγινάρα (3).

Παρατηρήσεις:

Το σκεύασμα συνιστάται να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικού στις καλλιέργειες. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του προσκολλητικού.

(1) Στην Αχλιάδια, πρέπει να προσέξετε, ώστε να μη συμβεί υπερβολική καρπόδεση. **(2)** Στην Σουλτανίνα για επιπαραδείγματα χρήση, προσέξτε ώστε να βραχύνουν καλά τα ταχυμιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε 2 φορές: α) όταν το 70% των φυλλών έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β) κατά την καρπόδεση, δηλαδή 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. **(3)** Στην Αγγινάρα, συνιστάται 3 συνολικοί ψεκασμοί σε διάστημα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συχνότητα η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλισθεί η επαρκής όδρευση. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για όδρευση. Εάν το νερό όδρευσης είναι αλκαλικό, πρέπει να αποφευχθεί η πολύ πρώιμη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σέλινο: 7 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγγεγραμμένες καλλιέργειες και στο συνιστώμενο χρόνο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα φάρμακα διαλύματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά σκευαυασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗ-ΗΜΙΑ ΑΛΗΣΕ: Διατηρείται το στην αρχική του κλειστή σκευαυασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος και σε θερμοκρασία πάνω από 0°C και κάτω από 32°C. Σε συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της εσωτερικής συσκευασίας.

Gibberellic Acid

GREENFARM 10TB

Gibberellic Acid (Γιββερελλικό οξύ) 10% Δισκία (TB)

Εγγυημένη σύνθεση: **Gibberellic Acid** 10% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 89,36% β/β

Αρ. Έγκρ.Κυκλοφ./Ημ. Λήξης: 8134/09.09.02/31.08.2015

Φυτορρυθμιστική ουσία

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Παπάδα 2 & Μεσσηγιών, 11525 Αθήνα
Τηλ.: 2106990932

Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΕΦΟΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2112055555, Φαξ: 2112055559
Θεσσα/νικ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. •Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των 32°C και μεγαλύτερη από 0°C.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Σε περίπτωση ατυχήματος, ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

03/200101-1

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 100 γρ. (10 x 10 γρ.)