

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και σκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. • Φοράτε κατάλληλες μπότες. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα.

• Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα περυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκουράστε. Ανευθунθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Η χρήση ατρόληνης και οξζλης δεν ενδείκνυται.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγκης του καπνού.

Απορροφητικότητα: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα/μίσχους, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή τυχόν συσσωρεύσεων υπολειμμάτων στους καρπούς.

Για την οροβάγκη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας.

Χρησιμοποιείται μικρό τύπου σκούπας και ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστικού: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστηριότητα glyphosate. Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται καταβυθισμένος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πλένουν στο νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

α) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

β) της πρόσβασης των ζώων στην ψεκασμένη περιοχή: Δεν επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας



GLYPH UP 36 SL

glyphosate (ομάδα φωσφονογλυκινικά)

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Glyphosate οξύ 36% β/ο,
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης (48,6% β/ο)
βοηθητικές ουσίες 57% β/β

**Διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών
(αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και
υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών καθώς
και για την καταπολέμηση της οροβάγκης του
καπνού**

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
- Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

N



Επικίνδυνο
για το περιβάλλον

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Αριθμ. Εγκρίσ. Κυκλοφορίας: 7468/24-3-1995

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Παρασκευαστής σκευάσματος-Εργοστάσιο παρασκευής: Monsanto Europe SA, Βέλγιο
Κατάχος της έγκρισης & Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Vectar Agro SA
Εργοστάσιο συσκευασίας - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Υ. Ευθυμιάδης ο.ε.ε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά), **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα** (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινια, Κερσιά), **Αμυγδαλιά** (Επιτραπέζια & Ονομαστική), **Ελιές**:

α) **Ετήσια ζιζάνια (*)** (αγρωστωδών, πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ./στρ. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μοιόδεξ), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp (πολιόκυμα, λαπάτσ), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Διο (2) το πολύ εφαρμογές στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης των ζιζανίων.

β) **Πολυετή ζιζάνια (**)** (αγρωστωδών, πλατύφυλλα): Μια (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά, κατά η ήλιο μετά από την άνοιξη. Αγριόδα (Cynodon dactylon): 750-1000 κ.εκ./στρ., Βέλιουρας (Sorghum halepense): 500 κ.εκ./στρ., Φτέρη (Pteridium aquilinum): 500 κ.εκ./στρ., Περικοκιάδα (Convolvulus arvensis): 1000 κ.εκ./στρ., Κίριοι (Cirsium arvense): 1000 κ.εκ./στρ., Κύπερη (Cyperus spp): Διο (2) εφαρμογές: α) 600 κ.εκ./στρ. κατά την άνοιξη και β) 500 κ.εκ./στρ. σε περίπτωση αναβάθμισης.

Βαμβάκι (*)**: Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας με 150-200 κ.εκ./στρ. για τα ετήσια ζιζάνια (1 εφαρμογή) και με 500 κ.εκ./στρ. για τα πολυετή ζιζάνια (βέλιουρας) (1 εφαρμογή).

Καπνός: Για την καταπολέμηση της οροβάγκης εφαρμόζεται με διο (2) ψεκασμούς καλύψεως: α) με 40 κ.εκ./στρ. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και β) με 60 κ.εκ./στρ. 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Αγριοι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:

α) **Ετήσια ζιζάνια (*)** (αγρωστωδών, πλατύφυλλα): μια εφαρμογή με 150-200 κ.εκ./στρ. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μοιόδεξ), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp (πολιόκυμα, λαπάτσ), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα. β) **Πολυετή ζιζάνια (**)** (ως ανωτέρω): Μια (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά, κατά η ήλιο μετά από την άνοιξη με 500-1000 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω.

Ακαθιέρργητες εκτάσεις: α) **Ετήσια ζιζάνια (*)** (αγρωστωδών, πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ./στρ. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μοιόδεξ), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp (πολιόκυμα, λαπάτσ), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Διο (2) το πολύ εφαρμογές στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης των ζιζανίων. β) **Πολυετή ζιζάνια (**)** (ως ανωτέρω): Μια (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά, κατά η ήλιο μετά από την άνοιξη με 500-1000 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. γ) **Ξυλωδείς θάμνοι, βάτα (Rubus):** 500-1000 κ.εκ./στρ. Μια (1) εφαρμογή στην πλήρη ανάπτυξη.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Υδροχαρή ζιζάνια: 800-100 κ.εκ./στρ. Μια (1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνοιξη των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Σε όλες τις χρήσεις (ήλην καπνού) εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα/στρ. Μόνο στον καπνό, για την καταπολέμηση της οροβάγκης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό/στρ.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (εξιδίωτα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνοιξη κατά την άνοιξη η ήλιο μετά από αυτή.

(***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι καταβυθισμένος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλύπτρων) γύρω από τα μπλε.

Παρατηρήσεις:

1. Στις δένδρικές καλλιέργειες και στα αμυγδαλιά ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι καταβυθισμένος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφύλλους και μη επουλωμένους πηλές του κλάδματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μοιόδεξ), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp (πολιόκυμα, λαπάτσ), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την αγριόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά.
4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλώμα της κορυφής.
5. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
7. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.
8. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
9. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
10. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.