

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός των φυλλωμάτων των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σπογόνια του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα, τους τριφύλους, βλάστους ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των ανισορροπιών υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την παράβαση των κανόνων εφαρμοζόμενα με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλλιέργειες της φυτικής.

Χρησιμοποιείται μικτή ακρόαση και ψεκαστεί με πίεση μικρότερη από 2 μπαρόμπα (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδύοντες τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκάβαση ή σκάφη νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Συνδυαστικότητα: —
Καθαρμένη ψεκαστική: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε τα βύτια και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίτη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναστέλλονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ (κ.ε.κ. σκ./σπ.) - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΤΕΡΜΟΕΙΔΗ (Παρασάβια, Μανταρίνι, Λεμόνι, Γκρέι-φρουτ, ΚΥΡΟΣ, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μήλο, Ανανά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκό, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Κεράσι), ΑΜΥΓΝΙΑ (επισπαστικό S αναπνοή), ΕΛΙΞΕΣ: **Εσπασμό ζιζανίων** (1) **Παρασάβια & παρασάβια:** 150-200 κ.ε.κ./σπ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.ε.κ./σπ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Δύο (2). **Ποσότητα ζιζανίων** (1) **Αμυγδαλιά:** 750-1000 κ.ε.κ./σπ., **Βελανιδιά:** 500 κ.ε.κ./σπ., **Παρασάβια:** 1000 κ.ε.κ./σπ. **Μία** (1) μόνο εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Κύνηρη:** 600 κ.ε.κ./σπ., στην 1^η εφαρμογή κατά την άνθηση και 500 κ.ε.κ./σπ. σε 2^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** δύο (2) για την Κύνηρη, μία (1) για τα υπόλοιπα ποικίλα ζιζάνια.

ΒΑΜΒΑΚΙ (1) **Εσπασμό ζιζανίων** (1) **Παρασάβια και παρασάβια:** 150-200 κ.ε.κ./σπ., **Πολυεστερικό ζιζανίο:** 500 κ.ε.κ./σπ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1). **ΚΑΠΝΟΣ:** ορθή, εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1). **ΚΑΠΝΟΣ:** ορθή, εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1). **ΚΑΠΝΟΣ:** ορθή, εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1). **ΚΑΠΝΟΣ:** ορθή, εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1).

ΑΓΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩ ΕΛΑΦΩΔΕ ΠΑ ΣΠΟΡΑ: **Εσπασμό ζιζανίων** (1) **Παρασάβια και παρασάβια:** 150-200 κ.ε.κ./σπ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.ε.κ./σπ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίων** (1) **500-1000 κ.ε.κ./σπ.** ανάλογα με το είδος του πολυεστερικού ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1).

ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασμό ζιζανίων** (1) **Παρασάβια και παρασάβια:** 150-200 κ.ε.κ./σπ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.ε.κ./σπ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίων** (1) **500-1000 κ.ε.κ./σπ.** ανάλογα με το είδος του πολυεστερικού ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1).

ακάνει στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** Δύο (2). **Ποσότητα ζιζανίων** (1) **500-1000 κ.ε.κ./σπ.** ανάλογα με το είδος του πολυεστερικού ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** Μία (1). **ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΝ:** **Υδατοεστ. ζιζανίων** 800-1000 κ.ε.κ./σπ. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** Μία (1).

ΟΡΓΑΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/σπ.): 20-40 λίτρα ανά στρέμμα για όλες τις περιπτώσεις, εκτός του κανονικού όπου εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνδυασμοί** με δύο εφαρμογές (κατευθυνόμενες) ή/και (καλοκαιρινή-φθινητή) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνδυασμός** με εφαρμογές όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. (***) Στο **Βαμβάκι** ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σπογόνια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα σπόρια και τα φύλλα των φυτών. Προσέχεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυμτάρια) γύρω από τα μπεκ.

Προειδοποίηση: 1. Στο διαβόητο καλλιεργούμενο και στο συνδυασμό ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σπογόνιων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τριφύλους βλάστους, παρασάβια και μη επιθυμητές πηγές κλάδων. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σημειωτές ή σημειωτές από τα τρία (3) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια (μολόχα, τσουνκίδα, πολυεστερικό, λαπατό, αναβλάστη) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.ε.κ./σπ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγρόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει υψός 15-30 εκ.στατό, 4. Για τη φρένη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής. 5. Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απορρυπαντική. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υγρό βλαστό πριν την συγκομιδή τους. 9. Για τις επιρριπόμενες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από τα δένδρα. 10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηρυχθεί: • Να εφαρμόζεται ενυδατικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μικροκλίμα, καλλιεργητικό μέτρο κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται αναγωγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία glyphosate. • Σε αρδευτικό και στραγγιστικό κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα προνή και με τρόπο ώστε τα σπογόνια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πνέει στα νερά.



Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Glyphosate [Οιμίδια φωσφονογλυκινών]

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Glyphosate οξύ 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπουλινής: 48,6% β/ο) Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγριοσταδίων, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υποχροχών ζιζανίων, ευλαδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάνης του καννίου. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφύλους βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βίωση των αρωματικών αμινοξέων.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7645/ 15-6-2001



Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: CHIMAC AGRIPHAR S.A., Rue de Renay 26, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
Παρασκευαστής - Εγγυητής παρασκευής του σκευάσματος: Monsanto Europe SA, Βέλγιο
Υπευθύνος επικοινωνίας - Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και αρίθμηση - Διανομέας:



Καθαρή ποσότητα του σκευάσματος: 1 ΛΙΤΡΟ

ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση Πηλγόρ - Ασπερόπουλος
Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 55 78 768
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 2310 795705 - **ΛΑΡΙΣΑ:** Τηλ.: 2410 627432

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άθρονα νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και ασφαλή προστασία ματιών/προσώπου. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μποτές εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεδομένα ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα στην παύση εάν δεν έχει τις οδηγίες του. Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απαικτικές προληπτικές σε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματολογική θεραπεία. Η χρήση σπριντλής και οξέως δεν ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Για να προσταφέτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μόνιμα αέρας ζωνών προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προσταφέτε τα φυτά μη σπάζετε να αφήσετε μόνιμα αέρας ζωνών προστασίας 10 μέτρων από τη μηχανή γνι.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: – β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταήμερο (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. γ) της προέλασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η δόσση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμη και όταν αυτά ξεραθούν.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία έμφαση πριν την συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτική χρήση: 7 ημέρες (σε όλες τις καλλιέργειες).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική αρωμαγμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, άρροσο και καλά αεριζόμενο.

Αριθμός παρτίδας (Batch No): **Βλέπε συσκευασία**
Ημερομηνία παραγωγής (Date of prod.):



Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός των φυλλωμάτων των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έρθουν σε επαφή τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα, τους τριφύλους, βλάστους ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των δυσχερών υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την παράβαση των κανόνων εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλλιέργειας της φυτικής.

Χρησιμοποιείται μικρή ακροσκόπια και ψεκαστές με πίεση μικρότερη από 2 μπαρόμπαρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδύοντες τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακρόσχο ή ακρόρη νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Συνδυαστικά: —

Καθαρμένη ψεκαστική: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλένετε τα βύτια και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλένετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίτη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναστρέφεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. εκ./ στρ.) - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΤΕΡΜΟΕΙΔΗ (Παρασιόφιλοι, Μοναρήνιο, Λεμόνι, Γερνι-φρούτι, ΚΥΡΟΣ, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΜΗΛΟΒΕΙΑ (Μήλο, Αμυγδαλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκό, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Κεράσι), ΑΜΥΓΝΙΑ (επισπασμό Σ αναπνοής), ΕΛΙΞΕΣ: **Εσπασό ζιζάνιο (*)**

(**Παρασιόφιλοι & παρασιόφιλοι**): 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp., Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2).** **Ποσότητα ζιζανίου (**):** Άνωθεν 750-1000 κ.εκ./στρ., **Βέλος** 500 κ.εκ./στρ., **Φύνη** 500 κ.εκ./στρ., **Παρασιόφιλοι, Κίρρα** 1000 κ.εκ./στρ. **Μία (1)** μόνο εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνοιξη, κατά την άνοιξη ή λίγο μετά από αυτή, **Κύνη** 600 κ.εκ./στρ., στην 1^η εφαρμογή κατά την άνοιξη και 500 κ.εκ./στρ., σε 2^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2)** για την Κύνη, **μία (1)** για τα υπόλοιπα σπορικά ζιζάνια.

ΒΑΜΒΑΚΙ ():** **Εσπασό ζιζάνιο (*)** (**Παρασιόφιλοι και παρασιόφιλοι**) 150-200 κ.εκ./στρ., **Ποσότητα ζιζανίου** 500 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΚΑΠΝΟΣ: Οροβόχοι Ψευδαίνο καλλιέργειας: α) 40 κ.εκ./στρ., 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και β) 60 κ.εκ./στρ., 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2).**

ΑΓΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΚΟΜΟΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩ ΕΛΑΦΩΔΕ ΠΑ ΣΠΟΡΑ: **Εσπασό ζιζάνιο (*)** (**Παρασιόφιλοι και παρασιόφιλοι**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp., Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίου (**):** 500-1000 κ.εκ./στρ., ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνοιξη, κατά την άνοιξη ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασό ζιζάνιο (*)** (**Παρασιόφιλοι και παρασιόφιλοι**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp., Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασό ζιζάνιο (*)** (**Παρασιόφιλοι και παρασιόφιλοι**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp., Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ακόμα και στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Δύο (2).** **Ποσότητα ζιζανίου (**):** 500-1000 κ.εκ./στρ., ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνοιξη, κατά την άνοιξη ή λίγο μετά από αυτή, **Συλόμενα θύνα** 500-1000 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία (1).**

ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΕΥΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΑΛΙΟΝ: **Υδατοφύκη ζιζάνιο** 800-1000 κ.εκ./στρ. Κοντά ή κατά την άνοιξη των ζιζανίων, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία (1).**

ΟΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.):

20-40 λίτρα ανά στρέμμα για όλες τις περιπτώσεις, εκτός του κανονικού όπου εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνδυασμοί** **μια με δύο εφαρμογές** (καμμένο-άνοξη) ή/και (καλοκαιρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωικής τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνδυασμός δύο εφαρμογών** όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνοιξη, κατά την άνοιξη ή λίγο μετά από αυτή. (***) Στο **Βαμβάκι** ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα στεγνά του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στεγνά και τα φύλλα των φυτών. Προσέχεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλτρίων) γύρω από τα μπεκ.

Παρατηρήσεις:

1. Στο **διαβρωτικό καλλιεργεμένο** και στο **αυτί** ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των στεγανών του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τριφύλλους βλάστους, παρασιόφους ή μη επιθυμητούς πηγές κλάδεσης. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπέρνους ή σπέρνους από τα τρία (3) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια (μολόχα, τσουνκίδα, πολυκόμ, λαπατό, αναρράκη) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.

3. Για την αγρόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει υψός 15-30 εκ.στατό, 4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλώμα της κορυφής.

5. Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.

6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απορρυπαντική.

7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει

8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υγρό βιομάζας πριν την συγκομιδή τους.

9. Για τις επιρριπόμενες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από τα δένδρα.

10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

• Να εφαρμόζονται ενυδατικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μικροκλίμα, καλλιεργητικό μέτρο κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται αναγωγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία glyphosate.

• Σε αρδευτικό και στραγγιστικό κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα προνή και με τρόπο ώστε τα στεγνά του ψεκαστικού διαλύματος να μην πνέει στα νερά.



GLYPHOKILL 36 SL

(ΓΛΑΪΦΟΚΙΑ)
GLYPHOSATE 36%
(ΓΛΑΪΦΟΣΕΪΤ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Glyphosate (Οιμίδια φωσφονογλυκινών)


Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Glyphosate οξύ 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπουλινής: 48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Διασυστηγικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγριοσταδίων, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υποχρορών ζιζανίων, ευλαδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβόχης του καννίου. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφύλλους βλάστους των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βίωση των αρωματικών αμινοξέων.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7645/ 15-6-2001



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



ΕΠΙΝΟΧΑΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: CHIMAC AGRIPHAR S.A., Rue de Renay 26, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
Παρασκευαστής - Εγγυητής παρασκευής του σκευάσματος: Monsanto Europe SA, Βέλγιο
Υπευθύνος επικοινωνίας - Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και αρίθμηση - Διανομέας:



ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση Πηλίο – Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 55 78 768
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 2310 795705 - **ΛΑΡΙΣΑ:** Τηλ.: 2410 627432

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άθρονα νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεδομένων ασφαλείας.
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα στην παύση εάν δεν έχει τις ασφάλειες του. Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απαικτικές προληπτικές σε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση σπριντλής και οξέως δεν ενδείκνυται.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Για να προσταφέτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφίσετε μόνον αφέκαστα ζωνιν προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προσταφέτε τα φυτά μη στάχους να αφίσετε μόνον αφέκαστα ζωνιν προστασίας **10 μέτρων** από τη μηχανική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: – β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταήμερον (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η δόσση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμη και όταν αυτά ξεραθούν.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτική χρήσης: 7 ημέρες (σε όλες τις καλλιέργειες).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική αρωμαγμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, άρροσο και καλά αεριζόμενο.

Αριθμός παρτίδας (Batch No): *Βλέπε συσκευασία*
Ημερομηνία παραγωγής (Date of prod.):



Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός των φυλλωμάτων των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έρθουν σε επαφή τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα, τους τριφύλλους, βλάστους ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των ανισορροπιών υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την παράβαση των κανόνων εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλντερίκις της φυτείας.

Χρησιμοποιείται μικτή ακρόαση και ψεκαστεί με πίεση μικρότερη από 2 μπαρόμπαρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδύοντες τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκάβαρο ή σκάφη νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Συνδυαστάκια: —
Καθαρμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύσος. Ξεπλένετε τα βύσος και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και από συνέχεια ξεπλένετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στα συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρίτη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναρριζούνται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. εκ./ στρ.) - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΣΤΕΡΜΟΕΙΔΗ (Παρασιόφιλα, Μοναριδιά, Λεγούμι, Γερμάνοφρου, ΚΥΡΗ, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΜΗΛΟΒΙΑ (Μήλα, Αμυγδαλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκό, Νεκταρίνα, Ροδάκινο, Κεράσι), ΑΜΥΓΝΙΑ (επισπασμό Σ αναπνοής), ΕΛΙΞΕΣ: **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη & πλαστωμένα**], 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Δύο (2). **Πολύ:** **α) ζιζάνια** (**), **Αμυγδαλιά** 750-1000 κ.εκ./στρ., **Βελανιδιά**, **Φύνη** 500 κ.εκ./στρ., **Περικαλιόδα**, **Κίρρα** 1000 κ.εκ./στρ. **Μία** (1) μόνο εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Κυρήνη**, 600 κ.εκ./στρ. στην 1^η εφαρμογή κατά την άνθηση και 500 κ.εκ./στρ. σε 2^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** δύο (2) για την **Κυρήνη**, **μία** (1) για τα υπόλοιπα ποικύλια **ζιζάνια**.

ΒΑΜΒΑΚΙ (** *) **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη και πλαστωμένα**] 150-200 κ.εκ./στρ., **Πολύ:** **Αμυγδαλιά** 500 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των φυτών πριν την έναρξη της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία** (1). **ΚΑΠΝΟΣ:** Οροβόχοι Ψεκασμό καλντερίκις: α) 40 κ.εκ./στρ. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και β) 60 κ.εκ./στρ. 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Δύο (2).

ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΚΟΜΟΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΦΩΩΝ ΠΙΑ ΣΠΟΡΑ: **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη και πλαστωμένα**] 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Πολύ:** **α) ζιζάνια** (**), 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία** (1).

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη και πλαστωμένα**] 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία** (1).

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη και πλαστωμένα**] 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία** (1).

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπασό ζιζάνια** (*) [**Γαλακτώδη και πλαστωμένα**] 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία** (1).

ακάνει στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** Δύο (2). **Πολύ:** **α) ζιζάνια** (**), 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Συλόμενα θύμια**, **Βάνα** 500-1000 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία** (1). **ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΕΥΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΑΛΙΟΝ:** **Υδροσπορή ζιζάνια** 800-1000 κ.εκ./στρ. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία** (1).

ΟΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.):
20-40 λίτρα ανά στρέμμα για όλες τις περιπτώσεις, εκτός του κανονικού όπου εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνδυασμοί** **μιας** με **δύο** εφαρμογές (καμμένο-ανάτη) ή/και (καλοκαιρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης. (***) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνδυασμός** **μιας** εφαρμογής όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. (***) Στο **Βαμβάκι** ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στεγνά και τα φύλλα των φυτών. Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε καλυμμάτων (καλυπτριών) γύρω από τα μπεκ.

Προειδοποίηση:
1. Στο διαδρόμο καλντερίκις και στα αυτιά ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των στεγανών του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τριφύλλους βλαστους, παρασπόδες και μη επωμωμένους πηγές κλάδεμας. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σημειών η σημειώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια (μολόχα, τσουνκίδες, πολυκόμης, λαπατό, αναρράκη) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την αγρόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει υψός 15-30 εκ.στατό, 4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής.
5. Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απορρυπαντική.

7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει
8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υγρό γάλακτο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στεγανά καλντερίκις.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
• Να εφαρμόζονται ενυδατικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μικροκλίμα, καλλιεργητικό μέτρο κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται αναγωγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την απώθηση ανάπτυξης ανεπιθύμητων ζιζανίων στη δραστηριότητα ψεκασμού.
• Σε αρδευτικό και παραγωγικό κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα προϊόντα και με τρόπο ώστε τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος να μην πλύνει στα νερά.



Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Glyphosate [Οιμίδια φωσφονογλυκινών]

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Glyphosate οξύ 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπουλινής: 48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Διασυστηγασκό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγριαστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υποχρορών ζιζανίων, ευλαδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβόχης του καννύ. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφύλλους βλαστους των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βίαισυνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7645/ 15-6-2001



Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: CHIMAC AGRIPHAR S.A., Rue de Renay 26, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
Παρασκευαστής - Εγγυητής παρασκευής του σκευάσματος: Monsanto Europe SA, Βέλγιο
Υπευθύνος επικοινωνίας - Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και αόμιση - Διανομέας:



Καθαρή ποσότητα του σκευάσματος: 10 ΛΙΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση Πηλιγό – Ασπερόπουλος
Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 55 78 768
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 2310 795705 - **ΛΑΡΙΣΑ:** Τηλ.: 2410 627432

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άθρονα νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και σκευική προστασία ματιών/προσώπου. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μποτές εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεκλίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα στην παύση αν δεν έχει τις οδηγίες του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απενθυθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση σπριντλής και οξέως δεν ενδεικνύεται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Για να προσταφέτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μόνω αφέκαστο ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προσταφέτε τα φυτά μη στάσεις να αφήσετε μόνω αφέκαστο ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μηχανή γνι.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: – β) σποράς ή φύτευσης των καλλιμεργιών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταήμερον (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. **γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμη και όταν αυτά ξεραθούν.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτική χρήσης: 7 ημέρες (σε όλες τις καλλιέργειες).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, άρροσέρο και καλά αεριζόμενο.

Αριθμός παρτίδας (Batch No): *Βλέπε συσκευασία*
Ημερομηνία παραγωγής (Date of prod.):





(ΓΛΑΪΦΟΚΙΑ)
GLYPHOSATE 36%
(ΓΛΑΪΦΟΣΕΪΤ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Glyphosate [Οιμίδια φωσφονογλυκινών]

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Glyphosate οξύ 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπουλμίνης: 48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηγασκό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγριαστωδών, πλατυφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ευλαδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάχνης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιόσυνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7645/ 15-6-2001



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια
διαμεγέθυση επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: CHIMAC AGRIPHAR S.A., Rue de Renay 26, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
Παρασκευαστής - Εγγυητής παρασκευής του σκευάσματος: Monsanto Europe SA, Βέλγιο
Υπευθύνος επικοινωνίας - Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και ομήγυνση - Διανομέας:



Καθαρή ποσότητα
του σκευάσματος:
20 ΛΙΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση Πηλίογ - Ασφοπύργος
Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 55 78 768

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 2310 795705 - ΛΑΡΙΣΑ: Τηλ.: 2410 627432



Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός των φυλλωμάτων των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έρθουν σε επαφή τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των ανισορροπιών υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την παράβαση των κανόνων εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλμάρων της φύλαξης.

Χρησιμοποιείται μικτή ακούαση και ψεκαστεί με πίσω μικρότερη από 2 εκτοκάρους (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδευόμενα τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακούαση ή ακούαση νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Συνδυαστάκια: —

Καθαρμένη ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύσος. Ξεπλύνετε τα βύσος και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίτη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. ακ./ στρ.) - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΤΕΡΜΟΕΙΔΗ (Παρασάβια, Μανταρίνι, Λεμόνι, Γκρέι-φρουίτ, Κίτρινο, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μήλο, Αμυγδαλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκό, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Κεράσι), ΑΜΙΓΜΑΤΑ (επικρατέστερο S αμυγδαλιά), ΕΛΙΕΣ: **Εσπάρτα ζιζανίου** (*)

(**Παρασάβια & εσπεριδοειδή**): 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2).** **Ποσότητα ζιζανίου** (**): **Εσπάρτα** 750-1000 κ.εκ./στρ., **Βελώνια**, **Φούρι** 500 κ.εκ./στρ., **Παρασάβια, Κίτρινο** 1000 κ.εκ./στρ. **Μία (1)** μόνο εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Κυπρίνη**, 600 κ.εκ./στρ., στην 1^η εφαρμογή κατά την άνθηση και 500 κ.εκ./στρ., σε 2^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2)** για την Κύπρινη, **μία (1)** για τα υπόλοιπα ποικίλα ζιζανία.

ΒΑΜΒΑΚΙ (**): **Εσπάρτα ζιζανίου** (*) (**Παρασάβια και εσπεριδοειδή**) 150-200 κ.εκ./στρ., **Ποσότητα ζιζανίου** 500 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των φυτών πριν την έναρξη της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΚΑΠΝΟΣ: Οροβάχνη Ψεκασμό καλμάρων: α) 40 κ.εκ./στρ. 40 ημέρες μετά τη μεταρρύθμιση και β) 60 κ.εκ./στρ. 60 ημέρες μετά τη μεταρρύθμιση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Δύο (2).**

ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΦΟΔΩ ΠΙΑ ΣΠΟΡΑ: **Εσπάρτα ζιζανίου** (*) (**Παρασάβια και εσπεριδοειδή**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίου** (**): 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπάρτα ζιζανίου** (*) (**Παρασάβια και εσπεριδοειδή**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίου** (**): 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: **Εσπάρτα ζιζανίου** (*) (**Παρασάβια και εσπεριδοειδή**) 150-200 κ.εκ./στρ. **Μολόχα, Τσουνκίδα, Polygatum sp, Αμυγδαλιά** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Ποσότητα ζιζανίου** (**): 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** **Μία (1).**

ακούνται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης, **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Δύο (2).** **Ποσότητα ζιζανίου** (**): 500-1000 κ.εκ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω. Όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή, **Συλλέκτης θύλακα** **Δόση** 500-1000 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία (1).**

ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΕΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΝ: **Υδατοκαθ. ζιζανίου** 800-1000 κ.εκ./στρ. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο:** **Μία (1).**

ΟΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.): 20-40 λίτρα ανά στρέμμα για όλες τις περιπτώσεις, εκτός του κανονικού όπου εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνδυασμοί** **μιας με δύο εφαρμογές** (καμίνιο-ανάλη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλιέργεια, όταν τα ζιζανία βρίσκονται στα στάδια της ζωής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνδυασμός** **μιας εφαρμογής** όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Στο **Βαμβάκι** ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στεγνά και τα φύλλα των φυτών. Προσέχεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλμάρων) γύρω από τα μπεκ.

Παρατηρήσεις:

1. Στο **διαβρωτικό καλλιεργεμένο** και στο **αυτελές** ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των στεγανών του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παρασάβια και μη επιθυμημένους πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκαταστημένους σημειώντες ή σημειώντες από τα τρίτα (3^η) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζανία (μολόχα, τσουνκίδες, πολυκόμμη, λαπατό, αναρράκη) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.

3. Για την αγρόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει υψός 15-30 εκ.σταστά.

4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής.

5. Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.

6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απορρυπαντική.

7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υγρό για βιομάζα πριν τη συγκομιδή τους.

9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από τα δένδρα.

10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

• Να εφαρμόζονται εντομοκτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μικροβιακή μέθοδος, καλλιεργητικό μέτρο κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται αναγωγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία glyphosate.

• Σε αρδευτικό και στραγγιστικό κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα προνή και με τρόπο ώστε τα στεγανά του ψεκαστικού διαλύματος να μην πλύνει στα νερά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άθρονα νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεδομένα ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα στην παύση αν δεν έχει τις οδηγίες του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απαικυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση σπριντλής και οξέων δεν ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μισή αφέκασση ζωνών προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στάσεις να αφήσετε μισή αφέκασση ζωνών προστασίας 10 μέτρων από τη μηχανή γιγ.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: – β) σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταήμερον (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμη και όταν αυτά ξεραθούν.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία έμφαση πριν την συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτική χρήσης: 7 ημέρες (σε όλες τις καλλιέργειες).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική αφαρμαγμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, άρροστο και καλά αεριζόμενο

Αριθμός παρτίδας (Batch No):

Βλέπε συσκευασία

Ημερομηνία παραγωγής (Date of prod.):

