



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φύλαξη.
Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή.
Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (να περά το ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφαιρέτε μίαν αψέκαστη ζώνη από μη γεωργική γη:
• **10 μέτρων** όταν χρησιμοποιείτε συμβατικά ακροφύσια, ή
• **5 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
• Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
Πιέρεται ένα μίγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολούθηστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

• Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε οξεία βλάβη. Ξεπλύνετε το στόμα.
• Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Χρησιμεύει στην αρχική του απορροβιότητα συσκευασία, καλά κλειστό, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.



Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων ναυατύφωθων ζιζανίων.

Συμπυκνωμένο αιώρημα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Metamifron70% β/ο
Βεληθτικές ουσίες40,5% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Παρτίδος ή Αποστολής:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.D.A.: 70079/09.04.2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της Άδειας:
Quena Plant Protection, N.V.
Pos Cabal Office Park, Unit 13, Κουρασάο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΔΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα, Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βιοβιώτας

ΓΚΟΛΤΙΞ: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων ημιαυτόφυλων ζιζανίων στις καλλιέργειες Ζαχαροτεύθων, κτηνοτροφικών τεύθων και παντζαριού. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες, αλλά και από το φύλλωμα των ζιζανίων. Αναστέλλει την φωτοσύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιομορφος ψεκασμός του εδάφους με μικρό τύπο σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm, με σταθερή ταχύτητα και υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανισμού με νερό μέχρι το μέσο. Προσθέστε τη συστασμένη ποσότητα σκευάσματος με τον ανανεωτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΗΓΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ-ΠΑΝΤΖΑΡΙ: Ετήσια ημιαυτόφυλα ζιζάνια.

α) Προφυπτική, αμέσως μετά τη σπορά: Δόση: 200-400 κ.εκ./στρ. Μία εφαρμογή με ομοιομορφο ψεκασμό των εδάφους και Μεταφυπτική: Μία έως τρεις εφαρμογές Δόση: 50-200 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύθων, όταν τα τεύθια έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έχουν έως 4-6 φύλλα. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 35-40 λίτρα/στρ.

β) Μεταφυπτική: Δόση: 100 κ.εκ./στρ. Τρεις εφαρμογές με ψεκασμό μετά το φύτευμα των τεύθων, όταν τα τεύθια έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έχουν έως 4-6 φύλλα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 λίτρα/στρ.

γ) Προφυπτική, αμέσως μετά τη σπορά: Μία εφαρμογή με ομοιομορφο ψεκασμό του εδάφους. Δόση: 200-250 κ.εκ./στρ. + 120-150 κ.εκ./στρ. Ethofumesate ALFA 50SC ή Ethosat 50SC. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα/στρ.

δ) Μεταφυπτική: Τρεις εφαρμογές με ψεκασμό μετά το φύτευμα των τεύθων, όταν τα τεύθια έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. Δόση: 62,5-100 κ.εκ./στρ. + 37,4-60 κ.εκ./στρ. Ethofumesate ALFA 50SC ή Ethosat 50SC. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25 λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις:

1) Η εφαρμογή της εφαρμογής συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθεί βροχή ή τεχνητή βροχή. 2) Η μεταφυπτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυπτική σε βαρείς εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των 2 πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύθων, όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυπτικού ή ψεκαστικής μόνο Goltix®, και από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυπτικού ψεκασμού με άλλα ζιζανιοκτόνα. 3) **Καταπολέμηση ζιζανίων:** α) Προφυπτική & Μεταφυπτικές εφαρμογές: Εισαχθέντα ζιζάνια: Λουβουδιά, Τάτουλας, Μελιόλας, Εισαχθέντα ζιζάνια: Αγριομελίτσα, Πολυκόμνη. β) Μεταφυπτικές εφαρμογές: Εισαχθέντα ζιζάνια: Αγριομελίτσα, Βήλητα, Ηλιοστρόφι, Λουβουδιά, Τάτουλας. γ) Προφυπτική αμέσως μετά τη σπορά, Εισαχθέντα ζιζάνια: Λουβουδιά, Ζαχός, Μελιόλας, Εισαχθέντα ζιζάνια: Τσουκνίδα, Πικρίδα, Καπνόχορτο. δ) Μεταφυπτική: Εισαχθέντα ζιζάνια: Βήλητα, Αγριομελίτσα, Εισαχθέντα ζιζάνια: Λουβουδιά. 4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια ήσσονος σημασίας Παντζάρι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΕΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

• Για αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών ημιαυτόφυλων ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης, στο ίδιο χωράφι. • Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να απορύν, εκτός από Ζαχαροτεύθων και κτηνοτροφικά τεύθια, αρακάς, κοκιά, πατάτες, καπνός και αραβόσιτος, αφού προηγηθεί άρση (15-20 εκ.). • Μην σπέρνετε ή φύτευετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω, πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άρση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15-20 εκ. • Σε περίπτωση συνδυασμού με Ethofumesate ALFA 50SC ή το Ethosat 50SC, να τηρούνται επίσης και οι σχετικές περιορισμοί που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- την είσοδο των ζώων στην καλλιέργεια: 103 ημέρες,
- την πρόσβαση των ανθρώπων: όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, μία (1) ημέρα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των Ζαχαροτεύθων και κτηνοτροφικών τεύθων και δεν παρουσιάζει κομμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Σε περιπτώσεις έντονων πλημμελειών και υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στις μεταφυπτικές εφαρμογές μπορεί να εφαρμοσθεί σε μείγμα με το Ethofumesate ALFA 50SC ή το Ethosat 50SC.

01/2014/4-5