

Goltix®

70WG

Metamitron (Μεταμιτρόν) 70%
Βρέξιμοι κόκκοι

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Ετήσια πηατύφυλλη και ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια⁽⁵⁾. Εφαρμογή: α) Πριν τη σπορά με ενσωμάτωση. Δόση: **500-700 γρ./στρ.** για ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη, **800-1000 γρ./στρ.** σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή σβάρνισμα. β) Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά. Δόση: **600 γρ./στρ.** με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους⁽²⁾. γ) Μεταφυτρωτικά. Δόση: **700 γρ./στρ. + 400-500 κ.εκ. ήάδι** σε ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη και **800 γρ./στρ. + 400-500 κ.εκ. ήάδι** σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη⁽⁴⁾ με ψεκασμό μετά το φύτεωμα των τεύτλων, όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα⁽³⁾.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις: **1)** Η προσπαρτική εφαρμογή γίνεται σε γυμνό έδαφος, κατά προτίμηση όταν το έδαφος είναι μέσης συστάσεως με έλλειψη επιφανειακής υγρασίας. **2)** Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή. **3)** Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο **Goltix®**. Από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. **4)** Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος των ζιζανίων και τον τύπο του εδάφους. **5)** Τα κυριότερα καταπολιεμούμενα ζιζάνια. Με 500 γρ./στρ. καταπολιεμούνται καλά τα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος, Λουβουδιά, Καφέληα, Χαμομήλι, Λάμιο, Ανθέμιδα, Στελλήρια, Τσουκνίδα, Λαψάνα, Γλυστροίδα, Ζωχός, Καλινσόγκα, Χρυσάνθεμο, Πόα. Με 700 γρ./στρ. καταπολιεμούνται καλά, εκτός από τα παραπάνω, τα: Βλήτα, Αγριοπιπεριά, Καπνόχορτο, Βρούβα*, Κενταύριο, Ντατούρα*, Παπαρούνα, Ραπανίδα*, Ποηυκόμυι, Περιοοούλι, Βερόνικα, Αγριομενεξές, Αγριοκαθαγιά. (*) Αυτά τα είδη καταπολιεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά. Με 1000 γρ./στρ. καταπολιεμούνται ικανοποιητικά, εκτός από τα παραπάνω, τα: Κολλητοίδα, Ποηύγωνο, Αθιπονουρά*. Ανθεκτικά ζιζάνια: Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*), Σκυλόχορτο (*Mercurialis annua*), Νεράγκαθο ή Κίραιο (*Cirsium arvense*), Περιοκοκλήδα (*Convolvulus arvensis*). Τα είδη Βλήτων *Amaranthus blitoides*, *Amaranthus lividus* και ο Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) δεν καταπολιεμούνται, όμως σοκρότναι σε βαθμό που δεν αποτελούν έντονο πρόβλημα.

ΓΚΟΛΤΙΞ 70:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολήμηση μονοετών, πηατύφυλλων και μερικών αγρωστώδων ζιζανίων για την καλλιεργεία των ζαχαροτεύτλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με 35-40 λίτρα νερό/ στρέμμα και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα (προφυτρωτική εφαρμογή ή πότισμα (προσπαρτική). Το χωράφι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένο (ψηλοχωματισμένο). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με μηεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi), με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου σιγά-σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές, διαλύστε το προϊόν στο βυτίο και μετά προσθέστε το ήάδι.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για την καλλιεργεία των ζαχαροτεύτλων και δεν παρουσιάζει καμμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές του **Goltix®** δεν επιτρέπεται ανάμειξη κανενός εντομοκτόνου. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη και εφαρμογή του **Goltix®** με γαλακτωματοποιητές, προσκολλητικά ή διαβρέκτες, καθώς και με υγρά λιπάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακκούλλες και τα σακκίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Goltix®

70WG

Metamitron (Μεταμιτρόν) 70%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Metamitron** 70% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 27,1% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλφο.: 7120/26.02.1980

Ημερ. Λήξης Έγκρισης: 28.02.2014

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολήμηση μονοετών, πηατύφυλλων και μερικών αγρωστώδων ζιζανίων στα ζαχαρότευτλα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Quena Plant Protection N.V. - Curacao,
Ολλανδικές Αντίλλες

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Magma Γεωργικές Εισροές ΕΠΕ.
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ. & Φαξ: 2111205598

Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσ/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους προστατευμένο από το κρύο. •Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιεργεία (εκτός τεύτλων) πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει όροση και καλλιεργεία του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15 εκ. •Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιεργείες. •Σε περίπτωση ρύπανσης αρδευτικού νερού, να μη χρησιμοποιηθεί άμεσα για άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. •Μην διηποψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορρυπαντικό (τα φίλτρα και μηεκ χωριστά).

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό



02/2010-1