

Goltix®

90WG

Metamitron (Μεταμιτρόν) 90%
Βρέξιμοι κόκκοι

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για την καταπολέμηση ετήσιων πηλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων.

α) **Πριν τη σπορά με ενσωμάτωση.** Δόση: **380-540 γρ./στρ.** για ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη, **620-770 γρ./στρ.** σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη. Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή σβάρνισμα.

β) **Αμέσως μετά τη σπορά.** Δόση: **460 γρ./στρ.** Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους.

γ) **Μεταφυτρωτικά.** Δόση: **540 γρ./στρ. + 400-500 κ.εκ. ράδι** σε ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη ή **620 γρ./στρ. + 400-500 κ.εκ. ράδι** σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη. Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων, όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.

Παρατηρήσεις: **1)** Η προσπαρτική εφαρμογή γίνεται σε γυμνό έδαφος, κατά προτίμηση όταν το έδαφος είναι μέσης συστάσεως με έλλειψη επιφανειακής υγρασίας. **2)** Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή. **3)** Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαρεία ή χουμώδη εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο **Goltix®**. Από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προληγθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. **4)** Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος των ζιζανίων και τον τύπο του εδάφους.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια. Με 380 γρ./στρ. καταπολεμούνται καλά τα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος, Λουβουδιά, Καψέλλα, Χαμομήλι, Λάμιο, Ανθέμιδα, Στελλήρια, Τσουκνίδα, Λαψάνα, Γλυστρίδα, Ζωχός, Καλινσόγκα, Χρυσάνθεμο, Πόα. Με 540 γρ./στρ. καταπολεμούνται καλά, εκτός από τα παραπάνω, τα: Βλήτα, Αγριοπιπεριά, Καπνόχορτο, Βρούβα*, Κενταύριο, Ντατούρα*, Παπαρούνα, Ραπανίδα*, Ποθυόμυι, Περδικούλι, Βερόνικα, Αγριομενέξες, Αγριοκαλαγιά. Με 770 γρ./στρ. καταπολεμούνται ικανοποιητικά, εκτός από τα παραπάνω, τα: Κολλητσιόδα, Ποθύγωνο, Αλεπονουρά*. (*) Αυτά τα είδη καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά. **Ανθεκτικά ζιζάνια:** Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*), Σκυλόχορτο (*Mercurialis annua*), Νεράγκαθο ή Κίριοιο (*Circium arvense*), Περικοκιάδα (*Convolvulus arvensis*). Τα είδη Βλήτων *Amaranthus blitoides*, *Amaranthus lividus* και ο Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) δεν καταπολεμούνται, όμως σοκάρονται σε βαθμό που δεν αποτελούν έντονο πρόβλημα.

ΓΚΟΛΤΙΞ 90:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών, πηλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων για την καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με 35-40 λίτρα νερό/στρέμμα και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα (προφυτρωτική εφαρμογή ή πότισμα (προσπαρτική). Το χώραφι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένο (ψιλοχωματισμένο). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm, με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου σιγά-σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνερίζοντας την ανάδευση. Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές, διαλύστε το προϊόν στο βυτίο και μετά προσθέστε το ράδι.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων και δεν παρουσιάζει καμμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές του **Goltix®** δεν επιτρέπεται ανάμειξη κανενός εντομοκτόνου. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη και εφαρμογή του **Goltix®** με γαλακτωματοποιητές, προσκολλητικά ή διαβρέκτες, καθώς και με υγρά λιπάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακκούλες και τα σακκίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Goltix®

90WG

Metamitron (Μεταμιτρόν) 90%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Metamitron** 90% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 8,22% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 7604/29.02.2000/2005

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών, πηλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων στα ζαχαρότευτλα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Παρασκευαστής:

Quena Plant Protection N.V.

Curacao, Ολλανδικές Αντίλλες

Τυποποιητής:

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Ισραήλ

Διανομή:

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Αντιπρόσωπος-Συσκευαστής:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Πλύντε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και δώστε του μεγάλη ποσότητα ιατρικού άνθρακα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΗ
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. •Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια (εκτός τεύτλων) πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άρση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15 εκ. •Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Σε περίπτωση ρύπανσης αρδευτικού νερού, να μη χρησιμοποιηθεί άμεσα για άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. •Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). •Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορριπτικό (τα φίλτρα και μπεκ χωριστά).

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό



01/2008-02