

ΕΣΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

"Παρέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση".
 ■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ■ Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

N

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
 ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη
 συσκευασία του.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζωά 30 μέρες μακριά από
 την ψερασμένη περιοχή

Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

SX®

Granstar® Extra sg
Ζιζανιοκτόνο

Καθ. Βάρος:
150 g e

DUPONT®

The miracles of science™

Διαλυτοί κόκκοι (SG)

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν-μεθύλ)	16,7	% β/β
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)	33,3	% β/β

Εγγυημένη σύνθεση: tribenuron methyl	16,7	% β/β
thifensulfuron-methyl	33,3	% β/β
Βοηθητικές ουσίες	47,74	% β/β

**Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την
 καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7740/21.01.2005

Παρασκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Τυποποιητής και συσκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
 τελική συσκευασία και σήμανση - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
 Τηλ: 210 688 9777 - 9778

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

3 576960 032650

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

K-27036/31009 - GREECE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

"Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση".
 ■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ■ Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε έμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε εθιθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζωα 30 μέρες μακριά από την ψεκασμένη περιοχή

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια

ΠΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

SX[®]

Granstar[®] Extra sg
Ζιζανιοκτόνο

**Καθ. Βάρος:
150 g e**

DUPONT[®]

The miracles of science[®]

Διαλυτοί κόκκοι (SG)

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν-μεθύλ)	16,7	% β/β
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)	33,3	% β/β

Εγγυημένη σύνθεση: tribenuron methyl	16,7	% β/β
thifensulfuron-methyl	33,3	% β/β
Βοηθητικές ουσίες	47,74	% β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7740/21.01.2005

Παρασκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Τυποποιητής και συσκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Διανομέας:
NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
 Τηλ: 210 688 9777 - 9778

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).



CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



K-27036/31009 - GREECE

SX[®]

Granstar[®] Extra SG

Ζιζανιοκτόνο



The miracles of science™

**Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων
ζιζανίων σε σιτάρι.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7740/21.01.2005

Παρασκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Τυποποιητής και συσκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και
σήμανση - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου

152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ: 210 688 9777 - 9778

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

Διαλυτοί κόκκοι (SG)

tribenuron-methyl (τριμπενουρόν-μεθύλ)	16,7 % β/β
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)	33,3 % β/β
Εγγυημένη σύνθεση:	
tribenuron methyl	16,7 % β/β
thifensulfuron-methyl	33,3 % β/β
Βοηθητικές ουσίες	47,74 % β/β

NOIR

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

“Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση”.
■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ■ Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

N**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

**Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή
τη συσκευασία του.**

**Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα 30 μέρες μακριά από την
ψεκασμένη περιοχή**

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ΓΚΡΑΝΣΤΑΡ ΕΞΤΡΑ SG, μίγμα tribenuron-methyl & thifensulfuron-methyl είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (μαλακό, σκληρό). Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα

και δευτερευόντως από την ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας. Αμέσως μετά την απορρόφηση το ΓΚΡΑΝΣΤΑΡ ΕΞΤΡΑ SG σταματά την ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων με ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα, νέκρωση και κατόπιν θάνατος) που μπορούν να εκδηλωθούν από 1-2 βδομάδες μετά την εφαρμογή. Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των σουλφονουλουριών δρουν στο ένζυμο συνθετάση του οξειγαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομοίομορφος ψεκασμός ζιζανίων με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (40 p.s.i) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καταπολεμά τα εξής πλατύφυλλα ζιζάνια:

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ανθεμίδα (*Anthemis* spp.), μπιφόρα (*Bifora radians*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), κίρσιο (*Cirsium arvense*), καπνόχορτο (*Fumaria* spp.), κολλητσίδα (*Galium spurium*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), ρανούγκουλος (*Ranunculus* spp.), αγριοσίναπο (*Sinapis arvensis*), στελλάρια (*Stellaria media*), λουβουδιά (*Chenopodium album*).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ζιτάρι (μαλακό και σκληρό): Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται καθολικός ψεκασμός μεταφυτρωτικά σε δόση 6-7.5 γραμ./στρέμμα + 0.05% κατ'όγκο μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND SL (isodecyl alcohol ethoxylate) από το στάδιο των 3 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι την έναρξη διόγκωσης του στάχου. Η δόση είναι ανάλογη του είδους του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

Για τα ζιζάνια *μπιφόρα*, *αγριομαργαρίτα*, *καπνόχορτο*, *κολλητσίδα*, *πολυκόμπι* και *ρανούγκουλος* να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση και η εφαρμογή να γίνεται πριν τα ζιζάνια αυτά ξεπεράσουν το στάδιο των 2-3 φύλλων.

Μέγιστη δόση/καλλιεργητική περίοδο: 7,5 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης (2-4 φύλλα).
2. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
3. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό.

4. Μετά από μία εφαρμογή με ΓΚΡΑΝΣΤΑΡ ΕΞΤΡΑ SG δεν συνιστάται η συγκαλλιέργεια ανάμεσα σε άλλα φυτά κτηνοτροφικών ή ψυχανθών (που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκάστηρας. Γεμίζεται πρώτα το βυτίο κατά το 1/4 με νερό, με συνεχή ανάδευση, προστίθεται η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος. Απογεμίζεται το βυτίο ψεκασιμού και προστίθεται το επιφανειοδραστικό. Σε περίπτωση ανάμειξης συνιστάται να μπαίνει πρώτα το ΓΚΡΑΝΣΤΑΡ ΕΞΤΡΑ SG στο βυτίο και να εφαρμόζεται το ψεκαστικό διάλυμα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παρασκευή του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μη ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρπηστε ή κάψτε τα καθαρά κενά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα σε κατάλληλο χώρο, ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις).

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμειξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Μην αυξάνετε τις δόσεις!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι, κριθάρι ή καλαμπόκι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (40 PSI).
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίστε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχανήμα.

1. Ξεπλύντε σχολαστικά με νερό (χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 10% της χωρητικότητας του βυτίου), όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του βυτίου (περιλαμβανομένου και του πώματος), προσέχοντας να αφαιρεθούν όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά τα μπεκ και τα φίλτρα. Στραγγίστε το υπόλοιπο του νερού ξεπλύματος από το βυτίο.
2. Επαναλάβετε το ξέπλυμα και το στράγγισμα.

Προσοχή! Συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθαρισμού των άλλων σκευασμάτων που θα εφαρμόσετε στο μίγμα βυτίου και σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε την πιο αυστηρή διαδικασία καθαρισμού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα σε κανονικές συνθήκες, εφ' όσον χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις της ετικέτας του.

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφopenίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κλπ.
- Συνιστάται να μην φυτεύεται ή σπέρνεται στο ίδιο χωράφι άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι, κριθάρι ή αραβόσιτο πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για ταυτόχρονη καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανίων, συνιστάται να συνδυάζεται το GRANSTAR EXTRA SG με τη συνιστώμενη δόση ενός από τα αγρωστωδοκτόνα Puma S 5,5 EW ή Puma S 6,9 EW.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, σε χώρο δροσερό παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

