

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
• Φυλάσσεται μακριά από τρέφειμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
• Οι εγχείσεις να μην εδραζονται στο νερό εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. • Οι εγχείσεις θα πρέπει να δοθούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εκτελούν στο νερό εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρούνται κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.
• Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. • Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/όλετο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ιδιαιτέρως την έκταση όπου είναι δυνατόν.
Σε περίπτωση εμετών: Μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Ξαπλώστε τον ύπτια και ξεκουράστε. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παρόντος εφαρμόστε τεχνική αναπνοής κατόπιν του γιατρού/αμέσως.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έλθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφρονα νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφρονα και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (ιδιαιτέρως την έκταση όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7283777
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τρώξτε για όλη ασφαλείας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλή διερεύνηση του αμπελιού και 15 μέτρων για τα μηλιάδικα.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

L173318 GREC/7R



syngenta®

Fludioxonil (χημική ομάδα φαινολυποπροπυλίων)

Εναιωρηματοποίησης Κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κ.Κ.Κ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 60376/03-07-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Δραστική ουσία: Fludioxonil 50% (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 47,4% (β/β)

Μυκητοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση του βοτρυτί στο αμπέλι και μετασυλλεκτικών ασθενειών στα μηλιάδικα με προσυλλεκτικές εφαρμογές.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούρα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
GEE/KH-BI/ΠΕ-Θ-Σινδόξ, Τηλ.: 231 0796940-3

XI



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο ύδατο περιβάλλον.

Product names marked ® or ™ are ALL MARKS TRADEMARKS OF SYNGENTA AG and its SUBSIDIARIES. GEE/KH-BI/ΠΕ-Θ-Σινδόξ, Τηλ.: 231 0796940-3 are trademarks of a Syngenta Group Company.

500 gr e

Τρόπος δράσης: Το fludioxonil (χημική ομάδα φαινολυποπροπυλίων) προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το απόσπασμα νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξεπνεύστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 3 φορές από όλο το υπολείμματά. Ξεπλένοντας με καθαρό νερό και ριχνόντας το νερό του ξεπλέγματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με καθαρή μηχανή ή γίνεται χρήση ξεπλέγματος με νερό του ξεπλέγματος τα ριχνόμενα στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενα με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, επαναφέρονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

Διαχείριση ανακυκλώσιμης: Για την αποφυγή της ανακύκλωσης της ανακύκλωσης ανατίθενται οι εφαρμογές με το GEE/50WG να γίνονται σε ανακύκλωση με μηχανήματα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις φαινολυποπροπυλίες. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται 2 εφαρμογές να γίνει μία εφαρμογή, οι εφαρμογές να γίνονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας και να αποσπώνονται οι θεραπευτικές εφαρμογές.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην εφαρμόσετε το σκευάσμα σε ευάλωτες περιοχές δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βιοποικιλότητα, ομαλό έδαφος και χαμηλή περατότητα σε οργανικό υπό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις ενκεχυμένες καλλιέργειες και στις αναπτυσσόμενες δασικές εφαρμογές.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αερισμένο μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μήλα: Ακλόδο: 3 ημέρες.

Αμπέλι: επαναδόση: 7 ημέρες.

Αμπέλι αναπνοή: 21 ημέρες.



Φύση δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στάχος	Δόσεις σκευάσματος γρ./100 σπασμα (max)	Υγρ./100 λίτρο ψεκ. υγρού σπασμα	Υγρ./100 λίτρο ψεκ. υγρού σπασμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Μήλα Ακλόδο	Μικροβιοφυσικές ασθένειες Diosporium spp. Puccinia spp. Alternaria spp. Botrytis cinerea Stemphylium spp. Alternaria spp.	45 30 150			Για την καταπολέμηση μετασυλλεκτικών ασθενειών με προσυλλεκτικές εφαρμογές. Εφαρμογή από το στάδιο όπου η διάσπαση των φρούτων είναι άμεση (μεγάλες καρπώ κρούσους έως το στάδιο πριν τη συγκομιδή).	Μέχρι 2 εφαρμογές με προσυλλεκτική 7 ημέρες εφύσον απαιτείται.
Αμπέλι (αναπνοή και επαναδόση)	Βοτρυτίς Botrytis cinerea	100 100 100			Εφαρμογή από το 70% της πτώσης των μίσπων έως το τέλος της ανθοδόσης και κατά την ωρίμανση.	Μέχρι 1 εφαρμογή εφύσον απαιτείται 2 εφαρμογές ή μετά 2 εφαρμογές εφύσον απαιτείται 3 εφαρμογές. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης όγκων νερού μικρότερων από τον όγκο ψεκαστικού υγρού στο σπρίτζ, διατηρείστε τη δόσολογία ανά σπρίτζ που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα.



Αρ. Παράδοξ:
Νη για Παραγωγή:

PE-AGI
925 096